

## Поиск по "Ацетилцистеин"

- 1 ["ФС.3.1.0108.22. Фармакопейная статья. Аланин + Аргинин + Валин + Гистидин + Глицин + Изолейцин + Лейцин + Лизин + Метионин + Пролин + Серин + Тирозин + Треонин + Триптофан + Фенилаланин + \*\*Ацетилцистеин\*\* + Ацетилтирозин, раствор для инфузий. Аминокислоты для парентерального питания, \(утв. и введена в действие Приказом Минздрава России от 11.04.2022 N 246\) \("Государственная фармакопея Российской Федерации. XIV издание"\)](#)
- 2 ["Методические указания по фотометрическому измерению концентраций \*\*ацетилцистеина\*\* \(N-ацетил-Цистеина\) в воздухе рабочей зоны"](#)  
(утв. Минздравом СССР 10.10.1991 N 5944-91)
- 3 [Постановление Правительства РФ от 14.02.2002 N 103 \(ред. от 01.02.2005\)](#)  
["Об утверждении перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств и изделий медицинского назначения для бесплатного приобретения гражданами, постоянно проживающими \(работающими\) на территории зоны проживания с правом на отселение, в соответствии с пунктом](#)  
| [316. \*\*Ацетилцистеин\*\* \(таблетки, гранулы, раствор для инъекций\)](#)
- 4 [Приказ Росстата от 23.12.2022 N 975](#)  
["Об утверждении наборов потребительских товаров и услуг и перечня базовых городов Российской Федерации для наблюдения за ценами и тарифами"](#)  
| [370. \*\*Ацетилцистеин\*\* \(АЦЦ\), 600 мг, 10 таблеток](#)
- 5 ["Временные методические рекомендации "Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции \(COVID-19\). Версия 17 \(09.12.2022\)"](#)  
(утв. Минздравом России) (вместе с "Рекомендациями по описанию данных РГ И КТ ОГК",  
"Инструкцией по проведению диагностики COVID-19 с применением методов амплификации  
| С целью улучшения отхождения мокроты при продуктивном кашле назначают мукоактивные препараты (**ацетилцистеин**, амброксол, карбоцистеин). Бронхолитическая ингаляционная терапия с использованием сальбутамола, фенотерола, с применением комбинированных средств
- 6 ["Методические рекомендации "Особенности клинических проявлений и лечения заболевания, вызванного новой коронавирусной инфекцией \(COVID-19\) у детей. Версия 2 \(03.07.2020\)"](#)  
(утв. Минздравом России)  
| Противокашлевые, отхаркивающие, муколитики, в том числе многочисленные патентованные препараты с различными растительными средствами, не рекомендуются для рутинного использования ввиду неэффективности. Рекомендовано назначение муколитических и

- 7 ["Государственный реестр лекарственных средств"](#)  
(по состоянию на 08.09.2023) (Часть 2)  
| **Ацетилцистеин**
- 8 ["Государственный реестр лекарственных средств"](#)  
(по состоянию на 08.09.2023) (Часть 1)  
| **Ацетилцистеин**
- 9 Справочная информация:  
["Санитарно-эпидемиологическое нормирование"](#)  
(Материал подготовлен специалистами КонсультантПлюс)  
| Методические указания по фотометрическому измерению концентраций **ацетилцистеина** (N-ацетил-Зцистеина) в воздухе рабочей зоны ... Минздрав СССР 10.10.1991 N 5944-91
- 10 Приказ Росгидромета от 09.01.2014 N 1  
["Об утверждении норм обеспечения бесплатным питанием, вещевым довольствием и лекарственными средствами лиц, входящих в состав Российской антарктической экспедиции"](#)  
(Зарегистрировано в Минюсте России 28.02.2014 N 31460)  
| R05CB ... **Ацетилцистеин** ... таблетки шипучие 100 мг N 20 ... упаковка ... 1 ... 75 ... 10 ... 8
- 11 Распоряжение Правительства РФ от 12.10.2019 N 2406-р (ред. от 09.06.2023)  
[<Об утверждении перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, а также перечней лекарственных препаратов для медицинского применения и минимального ассортимента лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи>](#)  
| ... **ацетилцистеин** ... гранулы для приготовления раствора для приема внутрь; ... гранулы для приготовления сиропа; ... порошок для приготовления раствора для приема внутрь; ... порошок для приема внутрь; ... раствор для внутривенного введения и ингаляций; ... раствор для приема
- 12 ["Клинические рекомендации "Грипп у взрослых"](#)  
(утв. Минздравом России)  
| Комментарии: **Ацетилцистеин**\*\* - по 1 таблетке по 200 мг - 2-3 раза в день, перорально, курс до 5 дней; Бромгексин - внутрь по 8 мг 3 (1 - 2 таблетки) 3-4 раза в сутки; Амброксол\*\* - внутрь 30 мг, 90 мг/сут, курс до 5 дней; [110]. Бромгексин...
- 13 ["Клинические рекомендации "Лекарственные поражения печени \(ЛПП\) у взрослых"](#)  
(утв. Минздравом России)  
| **Ацетилцистеин**\*\*

14 "Методические рекомендации "Стандарт диагностики и лечения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) у военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации. Версия 3 от 08.10.2021" (утв. Минобороны России 08.10.2021)

У пациентов с продуктивным кашлем (нозокомиальная инфекция, сопутствующие процессы - хронический бронхит и др.) возможно назначение мукоактивных препаратов (амброксол, **ацетилцистеин**).

15 "Клинические рекомендации "Острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ) у взрослых" (утв. Минздравом России)

Комментарии: **Ацетилцистеин\*\*** - по 1 таблетке по 200 мг - 2 - 3 раза в день, перорально, курс до 5 дней;

16 "Клинические рекомендации "Алкогольная болезнь печени (АБП) у взрослых" (утв. Минздравом России)

**#Ацетилцистеин#Ацетилцистеин** в дозе 300 мг на 1 кг массы тела пациента в сутки курсом на 14 дней рекомендован как препарат выбора в комбинированной терапии тяжелого течения АБП [86].

17 "Клинические рекомендации "Ожоги термические и химические. Ожоги солнечные. Ожоги дыхательных путей" (утв. Минздравом России)

...Возможно в течение 7 суток после ингаляционной травмы ингаляторное введение через небулайзер муколитических препаратов и **#гепарина натрия\*\*** (раствор **#ацетилцистеин\*\*** 20% - 3 мл каждые 4 часа чередующиеся с введением 5000 единиц (у детей) или 10000 единиц (у

18 "Клинические рекомендации "Бронхит" (утв. Минздравом России)

...ингаляции по 2 - 3 мл раствора в сутки, детям до 6 лет - 1 - 2 ингаляции по 2 мл раствора в сутки), перорально - **ацетилцистеин\*\*** (подросткам в возрасте старше 14 лет - 400 - 600 мг в сутки в 2 - 3 приема, детям в возрасте 6 - 14 лет - 300...

19 "Клинические рекомендации "Идиопатический легочный фиброз" (утв. Минздравом России)

- Монотерапию **ацетилцистеином\*\*** (Код АТХ: R05CB01) не рекомендуется назначать всем больным ИЛФ в рутинном порядке [2, 61].

20 "Клинические рекомендации "Биполярное аффективное расстройство" (утв. Минздравом России)

- **#ацетилцистеин\*\*** [141]

21 "Клинические рекомендации "Кистозный фиброз (муковисцидоз)"

(утв. Минздравом России)

- Перорально муколитики (#N-**ацетилцистеин** в разведении 1:5 в дозе 1,0 мл/кг)

22 "Клинические рекомендации "Острый синусит"

(утв. Минздравом России)

Вещества, содержащие свободные SH-группы, например, **ацетилцистеин**, способны оказывать прямое муколитическое действие и быстрый муколитический эффект на любой вид секрета.

23 "Клинические рекомендации "Отит средний острый"

(утв. Минздравом России)

Применяются препараты прямого муколитического действия содержащие свободные SH-группы, например, **ацетилцистеин\*\*** (код АТХ: R05CB01) для введения, в т.ч., и в барабанную полость, а также препараты непрямого муколитического действия на основе карбоцистеина (код АТХ:

24 "Клинические рекомендации "Внебольничная пневмония у взрослых"

(утв. Минздравом России)

...как ибупрофен\*\* в качестве жаропонижающих ЛС (при лихорадке > 38,5 °С) или анальгетиков (при наличии выраженного болевого синдрома, обусловленного плевритом), а также ЛС, улучшающие реологию бронхиального секрета (например, амброксол\*\*, **ацетилцистеин\*\***) [1, 2,

25 "Клинические рекомендации "Хронический бронхит"

(утв. Минздравом России)

- Рекомендуется пациентам с ХБ и продуктивным кашлем симптоматическая терапия муколитическими препаратами (амброксол\*\*, бромгексин, карбоцистеин, **ацетилцистеин\*\***, эрдостеин и др.), принимаемыми в общепринятых дозах, с целью регресса заболевания а также

26 "Клинические рекомендации "Обсессивно-компульсивное расстройство"

(утв. Минздравом России)

- #**Ацетилцистеин**, препарат с глутаматергическим действием, в 3 из 5 плацебо контролируемых РКИ, а также в серии клинических случаев и в систематическом обзоре доказал свою эффективность при присоединении к СИОЗС у резистентных к терапии пациентов с ОКР и

27 "Клинические рекомендации "Хроническая обструктивная болезнь легких"

(утв. Минздравом России)

- Назначение #**ацетилцистеина\*\*** 400 или 600 мг/сут и #карбоцистеина 750 мг 2 раза в сут рекомендуется пациентам с ХОБЛ при бронхитическом фенотипе и частых обострениях, особенно если не проводится терапия ИГКС [109, 197].

- 28 Приказ Минздрава РФ от 08.01.2002 N 9  
"О мерах по совершенствованию организации токсикологической помощи населению Российской Федерации"  
(вместе с "Положением об организации деятельности Центра острых отравлений", "Положением об организации деятельности отделения острых отравлений", "Положением об организации  
| 6. N-ацетилцистеин (таб., порошок)
- 29 Приказ Минздрава России от 28.10.2020 N 1165н (ред. от 13.04.2023)  
"Об утверждении требований к комплектации лекарственными препаратами и медицинскими изделиями упаковок и наборов для оказания скорой медицинской помощи"  
(Зарегистрировано в Минюсте России 26.11.2020 N 61099)  
| 1.33.1 ... R05CB01 ... ацетилцистеин ... ацетилцистеин ... раствор для инъекций или лиофилизат для приготовления раствора для инъекций и ингаляций
- 30 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 2 (ред. от 30.12.2022)  
"Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"  
(вместе с "СанПиН 1.2.3685-21. Санитарные правила и нормы...") (Зарегистрировано в Минюсте России 29.01.2021 N 62296)  
| 227... N-Ацетилцистеин ... 616-91-1 ... C5H9NO3S ... 5 ... а ... 3
- 31 Приказ Минздрава России от 04.10.2022 N 646н  
"Об утверждении стандарта медицинской помощи взрослым при ожогах термических и химических, ожогах солнечных, ожогах дыхательных путей (диагностика и лечение)"  
(Зарегистрировано в Минюсте России 09.11.2022 N 70871)  
| ... Ацетилцистеин ... 0,026 ... мг ... 600 ... 4 200
- 32 Приказ Минздрава России от 29.08.2022 N 574н  
"Об утверждении стандарта медицинской помощи взрослым при хроническом бронхите (диагностика и лечение)"  
(Зарегистрировано в Минюсте России 06.10.2022 N 70395)  
| ... Ацетилцистеин ... 0,4 ... мг ... 600 ... 111 000
- 33 Приказ Минздрава России от 29.08.2022 N 578н  
"Об утверждении стандартов медицинской помощи взрослым при хроническом среднем отите (диагностика и лечение)"  
(вместе со "Стандартом медицинской помощи взрослым при хроническом гнойном среднем отите (диагностика и лечение)", "Стандартом медицинской помощи взрослым при хроническом серозном  
| ... Ацетилцистеин ... 0,08 ... мг ... 400 ... 3 200

- 34 Приказ Минздрава России от 14.06.2022 N 409н  
"Об утверждении стандарта медицинской помощи детям при бронхите (диагностика и лечение) и о внесении изменений в стандарт специализированной медицинской помощи детям при острых респираторных заболеваниях тяжелой степени тяжести, утвержденный приказом Минздрава России (Зарегистрировано в Минюсте России 31.08.2022 N 69872)  
| ... **Ацетилцистеин** ... 0,12 ... мг ... 600 ... 3 000
- 35 Приказ Минздрава России от 24.12.2012 N 1380н (ред. от 14.06.2022)  
"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи детям при хронической бактериальной инфекции"  
(Зарегистрировано в Минюсте России 18.02.2013 N 27145)  
| ... **Ацетилцистеин** + Туаминогептан ... Тер. Доз. ... 6 ... 42
- 36 Приказ Минздрава России от 24.12.2012 N 1450н (ред. от 14.06.2022)  
"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи детям при острых респираторных заболеваниях тяжелой степени тяжести"  
(Зарегистрировано в Минюсте России 13.02.2013 N 27058)  
| ... **Ацетилцистеин** ... мг ... 600 ... 4200
- 37 Приказ Минздрава России от 01.04.2022 N 230н  
"Об утверждении стандарта первичной медико-санитарной помощи взрослым при остром среднем отите (диагностика и лечение)"  
(Зарегистрировано в Минюсте России 04.05.2022 N 68398)  
| ... **Ацетилцистеин** ... 0,14 ... мг ... 400 ... 2 000
- 38 Приказ Минздрава России от 10.03.2022 N 151н  
"Об утверждении стандарта медицинской помощи взрослым при хронической обструктивной болезни легких (диагностика, лечение и диспансерное наблюдение)"  
(Зарегистрировано в Минюсте России 14.04.2022 N 68207)  
| ... **Ацетилцистеин** ... 0,4 ... мг ... 600 ... 24 000
- 39 Приказ Минздрава России от 23.10.2020 N 1144н (ред. от 22.02.2022)  
"Об утверждении порядка организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих (Зарегистрировано в Минюсте России 03.12.2020 N 61238)  
| 1.27.1 ... R05CB01 ... Муколитики ... **Ацетилцистеин** ... порошок для приготовления раствора для приема внутрь

- 40 "Клинические рекомендации "Хроническая болезнь почек (ХБП)"  
(утв. Минздравом России)  
Лекарства: ... а) повышают продукцию креатинина: фенофибрат\*\*, альфакальцидол\*\*, кальцитриол\*\*, парикальцитол\*\*, преднизолон\*\*; ... б) подавляют тубулярную секрецию креатинина: ... сульфаметоксазол+триметоприм\*\*; ... в) способны вступать в реакцию Яффе:
- 41 "Клинические рекомендации "Гипертрофическая кардиомиопатия"  
(утв. Минздравом России)  
**Ацетилцистеин\*\*** ... Изменение чувствительности к кальцию, регресс гипертрофии, фиброза, улучшение диастолической дисфункции. ... Фаза I рандомизированного контролируемого исследования HALT
- 42 Приказ Минздрава России от 07.11.2012 N 615н (ред. от 10.05.2017)  
"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при новообразованиях гипофиза"  
(Зарегистрировано в Минюсте России 22.01.2013 N 26655)  
... **Ацетилцистеин** ... мг ... 500 ... 5000
- 43 Приказ Минздрава России от 29.09.2016 N 747н  
"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при пневмокониозе, вызванном асбестом и другими минеральными веществами"  
(Зарегистрировано в Минюсте России 13.10.2016 N 44032)  
... **Ацетилцистеин** ... 0,5 ... мг ... 300 ... 3000
- 44 Рекомендация Коллегии Евразийской экономической комиссии от 05.09.2023 N 22  
"О перечне действующих веществ и нерациональных комбинаций действующих веществ, медицинское применение которых в качестве лекарственных препаратов признано нерациональным"  
45. **Ацетилцистеин** + амброксол + фенилэфрин + левоцетиризин
- 45 Рекомендация Коллегии Евразийской экономической комиссии от 29.12.2015 N 30  
"О Правилах отнесения лекарственных препаратов с учетом действующих веществ, входящих в их состав, к категориям лекарственных препаратов, отпускаемых без рецепта и по рецепту"  
**Ацетилцистеин** ... R05CB01 ... II <\*>
- 46 Приказ Минздрава России от 07.11.2012 N 653н (ред. от 30.01.2023)  
"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при дегенеративных заболеваниях позвоночника и спинного мозга"  
(Зарегистрировано в Минюсте России 25.01.2013 N 26717)  
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз

- 47 Приказ Минздрава России от 29.12.2012 N 1658н  
"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при пневмонии средней степени тяжести"  
(Зарегистрировано в Минюсте России 13.02.2013 N 27046)
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз
- 48 Приказ Минздрава России от 28.12.2012 N 1596н  
"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при бронхоэктатической болезни"  
(Зарегистрировано в Минюсте России 06.03.2013 N 27521)
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз
- 49 Приказ Минздрава России от 28.12.2012 N 1654н  
"Об утверждении стандарта первичной медико-санитарной помощи детям при острых назофарингите, ларингите, трахеите и острых инфекциях верхних дыхательных путей легкой степени тяжести"  
(Зарегистрировано в Минюсте России 13.02.2013 N 27051)
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз
- 50 Приказ Минздрава России от 24.12.2012 N 1396н  
"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при остром промиелоцитарном лейкозе в стадии ремиссии (поддерживающая терапия)"  
(Зарегистрировано в Минюсте России 15.05.2013 N 28411)
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз