

Поиск по "Азитромицин"

- 1 ["Государственная фармакопея Российской Федерации. XII издание. Часть 1"](#)
| **Азитромицин** (ФС 42-0213-07)
- 2 ["Пояснения к единой Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Содружества Независимых Государств \(ТН ВЭД СНГ\)"](#)
(утв. решением Совета руководителей таможенных служб государств - участников Содружества Независимых Государств от 14.06.2017 N 10/65) (Том 2. Разделы VI (2/2) - VIII. Группы 29 - 43)
| В данную субпозицию включаются, inter alia, кларитромицин (INN) и диритромицин (INN). Однако **азитромицин** (INN), который содержит 15-атомное центральное кольцо, и пикромицин, не содержащий ни кладинозы, ни микарозы, не рассматриваются как производные эритромицина.
- 3 [Постановление Правительства РФ от 14.02.2002 N 103 \(ред. от 01.02.2005\)](#)
["Об утверждении перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств и изделий медицинского назначения для бесплатного приобретения гражданами, постоянно проживающими \(работающими\) на территории зоны проживания с правом на отселение, в соответствии с пунктом](#)
| [74. Азитромицин](#) (таблетки, сироп, порошок)
- 4 [Приказ Росстата от 23.12.2022 N 975](#)
["Об утверждении наборов потребительских товаров и услуг и перечня базовых городов Российской Федерации для наблюдения за ценами и тарифами"](#)
| [366. Азитромицин](#), 500 мг, 10 капсул (таблеток)
- 5 ["Временные методические рекомендации "Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции \(COVID-19\). Версия 17 \(09.12.2022\)"](#)
(утв. Минздравом России) (вместе с "Рекомендациями по описанию данных РГ И КТ ОГК",
"Инструкцией по проведению диагностики COVID-19 с применением методов амплификации
| ...к макролидам (определяется по эритромицину) следует рассмотреть возможность применения РХ. Следует отдавать предпочтение наиболее изученным при ВП макролидам с улучшенными фармакокинетическими свойствами (**азитромицин**, кларитромицин); при известной или
- 6 ["Методические рекомендации "Организация оказания медицинской помощи беременным, роженицам, родильницам и новорожденным при новой коронавирусной инфекции COVID-19. Версия 5 \(28.12.2021\)"](#)
(утв. Минздравом России)
| Беременным пациенткам терапию ингибитор защищенными аминопенициллинами и цефалоспорины целесообразно сочетать с макролидами (**азитромицин**, джозамицин), учитывая возможность вторичной пневмонии, связанной с внутриклеточными патогенами (микоплазмы,

7 "Временные методические рекомендации "Оказание амбулаторно-поликлинической медицинской помощи пациентам с хроническими заболеваниями, подлежащим диспансерному наблюдению, в условиях пандемии COVID-19. Версия 2"

(утв. ФГБУ "НМИЦ ТПМ" Минздрава России (протокол от 19.10.2021 N 10))

- эксперты рекомендуют избегать сочетания антиаритмических препаратов IA, IC, III класса с такими антибактериальными препаратами, как **азитромицин**, кларитромицин, эритромицин, ципрофлоксацин, левофлоксацин, моксифлоксацин, офлоксацин, метронидазол, пиперациллин,

8 "Временные методические рекомендации "Лекарственная терапия острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) в амбулаторной практике в период эпидемии COVID-19. Версия 2 (16.04.2020)"

(утв. Минздравом России)

В соответствии с консенсусным экспертным мнением при лечении COVID-19 рекомендуется несколько лекарственных препаратов, которые можно использовать как в монотерапии, так и в комбинации: МНН:хлорохин, МНН:гидроксихлорохин, МНН:мефлохин,

9 <Письмо> Россельхознадзора от 26.04.2023 N ФС-АК-7/10343

<О введении режима усиленного лабораторного контроля в отношении продукции предприятий, поступившей в Российскую Федерацию из Республики Беларусь>

4. ОАО "КВИНФУД" - выявление в готовых мясных изделиях (тушеная говядина) кетопрофена, метиламиноантипирина и массовой доли **азитромицина**.

10 "Пояснения к единой Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза (ТН ВЭД ЕАЭС)"

(ред. от 03.12.2019) (Том II. Разделы VI - VIII. Группы 29 - 43)

В данную субпозицию включаются, inter alia, кларитромицин (INN) и диритромицин (INN). Однако **азитромицин** (INN), который содержит 15-атомное центральное кольцо, и пикромицин, не содержащий ни кладинозы, ни микарозы, не рассматриваются как производные эритромицина.

11 "Государственный реестр лекарственных средств"

(по состоянию на 08.09.2023) (Часть 2)

Азитромицин Экомед(R)**Азитромицин**

12 "Государственный реестр лекарственных средств"

(по состоянию на 08.09.2023) (Часть 1)

ЛП-000362 ... 22.02.2011 ... Хемофарм А.Д. ... Сербия ... Хемомицин ... **Азитромицин** ... лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий, 500 мг, 500 мг - флаконы - пачки картонные - По рецепту; ... Производитель (Все стадии, включая выпускающий

- 13 Приказ Росгидромета от 09.01.2014 N 1
"Об утверждении норм обеспечения бесплатным питанием, вещевым довольствием и лекарственными средствами лиц, входящих в состав Российской антарктической экспедиции"
(Зарегистрировано в Минюсте России 28.02.2014 N 31460)
J01FA ... **Азитромицин** ... таблетки 25 мг N 6 ... упаковка ... 1 ... 30 ... 5 ... 4
- 14 <Письмо> Россельхознадзора от 23.06.2023 N ФС-КС-2/15452
<О запрете обращения на территории Российской Федерации ветеринарных лекарственных препаратов, зарегистрированных в соответствии с законодательством другого государства - члена Евразийского экономического союза>
26 ... **Азитромицин** 10% ... Хебей Янженг Фармасьютикл Ко. Лтд, Китай ... 6220-10-18 ЗА ...
Антибактериальный препарат ... 09.10.2019
- 15 Распоряжение Правительства РФ от 12.10.2019 N 2406-р (ред. от 09.06.2023)
<Об утверждении перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, а также перечней лекарственных препаратов для медицинского применения и минимального ассортимента лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи>
J01FA ... макролиды ... **азитромицин** ... капсулы; ... лиофилизат для приготовления раствора для инфузий; ... лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий; ... порошок для приготовления суспензии для приема внутрь; ... порошок для
- 16 <Письмо> Россельхознадзора от 10.04.2023 N ФС-КС-2/8318
<О направлении обновленного "Списка лекарственных препаратов для ветеринарного применения и кормовых добавок для животных, зарегистрированных на территории Республики Казахстан, Республики Беларусь, Республики Армения", в отношении которых принято решение о запрете
28 ... **Азитромицин** 10% ... Хебей Янженг Фармасьютикл Ко.Лтд, Китай ... 6220-10-18 ЗА ...
Антибактериальный препарат ... 09.10.2019
- 17 <Письмо> Россельхознадзора от 24.03.2022 N ФС-КС-2/7938
<О принятии решения о запрете обращения на территории Российской Федерации ветеринарных лекарственных препаратов>
29 ... **Азитромицин** 10% ... Хебей Янженг Фармасьютикл Ко. Лтд, Китай ... 6220-10-18 ЗА ...
Антибактериальный препарат ... 09.10.2019
- 18 <Письмо> Россельхознадзора от 26.01.2022 N ФС-КС-2/1884
<О временном приостановлении (прекращении) ввоза лекарственных препаратов (кормовых добавок), не зарегистрированных на территории Российской Федерации>
29 ... **Азитромицин** 10% ... Хебей Янженг Фармасьютикл Ко.Лтд, Китай ... 6220-10-18 ЗА ...
Антибактериальный препарат ... 09.10.2019

- 19 <Письмо> Россельхознадзора от 17.12.2021 N ФС-КС-2/36802
<О временном приостановлении (прекращении) ввоза лекарственных препаратов (кормовых добавок), не зарегистрированных на территории Российской Федерации>
29 ... **Азитромицин** 10% ... Хебей Янженг Фармасьютикл Ко.Лтд, Китай ... 6220-10-18 ЗА ...
Антибактериальный препарат ... 09.10.2019
- 20 <Письмо> Россельхознадзора от 01.12.2021 N ФС-КС-2/34993
<О временном приостановлении ввоза на территорию Российской Федерации лекарственных препаратов (кормовых добавок) для ветеринарного применения, не зарегистрированных на территории Российской Федерации>
29 ... **Азитромицин** 10% ... Хебей Янженг Фармасьютикл Ко.Лтд, Китай ... 6220-10-18 ЗА ...
Антибактериальный препарат ... 09.10.2019
- 21 Распоряжение Правительства РФ от 06.07.2010 N 1141-р (ред. от 01.08.2020)
<Об утверждении перечня стратегически значимых лекарственных средств>
6. ... **Азитромицин**
- 22 "Клинические рекомендации "Врожденный клапанный стеноз аорты"
(утв. Минздравом России)
...у детей до 3-х лет) в дозе 50 мг/кг (максимум 2,0 г) внутрь за 1 час до процедуры, или
#азитромицин** (off-label у детей до 12-ти лет) в дозе 15 мг/кг (максимум 500 мг), или
klarитромицин** в дозе 15 мг/кг...
- 23 "Клинические рекомендации "Пневмония (внебольничная)"
(утв. Минздравом России)
...лет при нетяжелом течении ВП амбулаторно в связи с частой "атипичной" этиологией ВП у
пациентов данной возрастной группы рекомендованы также макролиды (например,
азитромицин**, klarитромицин** или другие макролиды, в инструкции к которым имеются
- 24 "Клинические рекомендации "Гемолитико-уремический синдром"
(утв. Минздравом России)
Нет единого мнения в вопросе, необходимо ли назначать антибиотики, не вызывающие
бактериальный лизис, такие как макролиды (**азитромицин****) сибсам пациентов со STEC
позитивным ГУС.
- 25 "Клинические рекомендации "Брюшной тиф (инфекция, вызванная *Salmonella Typhi*) у взрослых"
(утв. Минздравом России)
- Рекомендован **#азитромицин**** (1 г внутривенно или внутрь, затем 0,5 г внутривенно или внутрь
один раз в день 7 дней) при развитии резистентности к фторхинолонам или при отсутствии
данных о чувствительности *S. Typhi* к АМП [1, 2, 3, 4, 10, 11, 18, 20, 22, 27...

26 "Клинические рекомендации "Сальмонеллез у детей"

(утв. Минздравом России)

Комментарии: при наличии показаний назначаются антибактериальные препараты в соответствии с чувствительностью выделенных штаммов, к стартовым препаратам относятся нифуроксазид, **#азитромицин**** 10 мг/кг веса в сутки 3 - 5 дней, цефтриаксон** [12, 13, 30 - 34].

27 "Клинические рекомендации "Язвенная болезнь желудка и/или двенадцатиперстной кишки"

(утв. Минздравом России)

...таблетки с 12 лет** и #гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь**) и **#метронидазолу**** существенно повышается в случае приема любых макролидов (эритромицина**, **азитромицина****, джозамицина** и кларитромицина** (таблетки с 12 лет** и #гранулы для

28 "Клинические рекомендации "Бронхит"

(утв. Минздравом России)

- **азитромицин**** 10 мг/кг/сутки внутрь в 1 прием (максимально 500 мг/сутки) в течение 3 - 5 дней (УУР - В; УДД - 2)

29 "Клинические рекомендации "Выкидыш (самопроизвольный аборт)"

(утв. Минздравом России)

Для пациенток, не обследованных на хламидийную инфекцию или с хламидийной инфекцией, назначается **#азитромицин**** 1 г перорально в сочетании с **#метронидазолом**** 1 г перорально в день прерывания беременности.

30 "Клинические рекомендации "Кистозный фиброз (муковисцидоз)"

(утв. Минздравом России)

...Псевдо-Барттер синдроме с целью контроля влияния электролитных нарушений на сердечную деятельность, перед началом терапии ингибиторами протонного насоса, препаратами против НТМБ, при длительном применении **азитромицина**** по другим показаниям, на фоне терапии

31 "Клинические рекомендации "Паратонзиллярный абсцесс"

(утв. Минздравом России)

20. Богомильский М.Р. Опыт применения **азитромицина** в терапии обострений хронического тонзиллита/М.Р. Богомильский, Т.И. Гаращенко, Е.В. Шишмарева//Российская оториноларингология. 2003. -

32 "Клинические рекомендации "Экзема"

(утв. Минздравом России)

#азитромицин** перорально 500 мг 1 раз в сутки в течение 3 - [32, 90, 125]

- 33 ["Клинические рекомендации "Внебольничная пневмония у взрослых"](#)
(утв. Минздравом России)
- Пациентам с ВП без значимых сопутствующих заболеваний и других факторов риска инфицирования редкими и/или ПРВ рекомендуется в качестве препарата выбора: амоксициллин**, альтернативы - макролиды (**азитромицин****, кларитромицин**) [108, 109].
- 34 ["Клинические рекомендации "Роды одноплодные, самопроизвольное родоразрешение в затылочном предлежании \(нормальные роды\)"](#)
(утв. Минздравом России)
- ...900 мг каждые 8 часов до окончания родов [60], [61]. Из-за глобального роста резистентности *S. agalactiae* к препаратам группы макролидов (эритромицин, **азитромицин****), в настоящее время не рекомендуется их применять для эмпирической профилактики [63]. При аллергии на бета-
- 35 ["Клинические рекомендации "Хроническая обструктивная болезнь легких"](#)
(утв. Минздравом России)
- Назначение макролидов (**#азитромицина****) в режиме длительной терапии по 250 мг/сут или 500 мг каждые 3 суток/неделю рекомендуется пациентам с ХОБЛ с бронхоэктазами и частыми гнойными обострениями [107, 108].
- 36 ["Клинические рекомендации "Хламидийная инфекция"](#)
(утв. Минздравом России)
- азитромицин**** 1,0 г однократно [31, 33].
- 37 ["Клинические рекомендации "Урогенитальные заболевания, вызванные *Mycoplasma genitalium*"](#)
(утв. Минздравом России)
- #азитромицин**** внутрь 500 мг - 1-й день, затем по 250 мг 1р/д в течение 4 суток (общая длительность лечения 5 дней) [45].
- 38 ["Временные методические рекомендации "Ведение пациентов с рассеянным склерозом в условиях пандемии COVID-19. Версия 1 \(19.04.2020\)"](#)
(утв. Минздравом РФ)
5. **Азитромицин**, хлорохин/гидроксихлорохин, лопинавир + ритонавир имеют риск кардиотоксичности и жизнеугрожающих аритмий (могут вызывать удлинение QT и желудочковую тахикардию по типу пируэт).
- 39 ["Временные методические рекомендации "Ведение пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения в контексте пандемии COVID-19. Версия 2"](#)
(утв. Минздравом России 16.04.2020)
- **Азитромицин**, хлорохин/гидроксихлорохин, лопинавир + ритонавир имеют риск кардиотоксичности и жизнеугрожающих аритмий (могут вызывать удлинение QT и желудочковую тахикардию по типу пируэт).

- 40 ["Клинические рекомендации "ВИЧ-инфекция у взрослых"](#)
(утв. Минздравом России)
- По решению врачебной комиссии при непереносимости кларитромицина** возможно включение в комбинацию #азитромицина** 500 мг 1 раз в сутки. [108] (5С)
- 41 ["Клинические рекомендации "Миокардиты"](#)
(утв. Минздравом России)
- Реакция гиперчувствительности к некоторым препаратам (гидрохлоротиазид (C03AA03), фуросемид**, пенициллинам широкого спектра действия (J01CA), ампициллин**, **азитромицин****, сульфаниламиды, тетрациклин, метилдопа**, аминофиллин**, фенитоин**, бензодиазепины
- 42 <Письмо> ФМБА России от 05.11.2019 N 32-024/758
["О направлении рекомендаций"](#)
(вместе с Информационным письмом "Клинико-диагностические аспекты микоплазменной инфекции в очагах. Лечение, профилактика")
- Предпочтение следует отдавать детским лекарственным формам (суспензия) антибиотиков группы азалидов (**азитромицин**) или джозамицину, рокситромицину, кларитромицину (таблица).
- 43 Приказ Минздрава России от 01.02.2023 N 36н
["Об утверждении перечня лекарственных препаратов и фармакотерапевтических групп лекарственных препаратов, разрешенных к реализации в рамках эксперимента по осуществлению розничной торговли лекарственными препаратами для медицинского применения, отпускаемыми"](#)
(Зарегистрировано в Минюсте России 21.02.2023 N 72431)
- Азитромицин** ...J01FA10 ... антибактериальные средства системного действия; ... макролиды, линкозамины и стрептограминны; ... макролиды ... порошок для приготовления суспензии для приема внутрь; ... капсулы; ... таблетки диспергируемые; ... таблетки, покрытые пленочной
- 44 Приказ Минздрава России от 09.01.2023 N 4н
["Об утверждении стандарта медицинской помощи взрослым при синдроме гиперстимуляции яичников \(диагностика и лечение\)"](#)
(Зарегистрировано в Минюсте России 31.01.2023 N 72188)
- ... **Азитромицин** ... 0,000084 ... мг ... 500 ... 3 000
- 45 Приказ Минздрава России от 09.01.2023 N 3н
["Об утверждении стандарта медицинской помощи при истмико-цервикальной недостаточности \(диагностика и лечение\)"](#)
(Зарегистрировано в Минюсте России 31.01.2023 N 72189)
- ... **Азитромицин** ... 0,01 ... мг ... 500 ... 1 000

- 46 Приказ Минздрава России от 09.01.2023 N 2н
"Об утверждении стандарта медицинской помощи при свершившемся выкидыше (самопроизвольном аборте) и неразвивающейся беременности (диагностика и лечение) и о внесении изменений в стандарт специализированной медицинской помощи при самопроизвольном (Зарегистрировано в Минюсте России 31.01.2023 N 72190)
| ... **Азитромицин** ... 0,0052 ... мг ... 500 ... 2 000
- 47 Приказ Минздрава России от 07.11.2012 N 590н (ред. от 09.01.2023)
"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при самопроизвольном прерывании беременности"
(Зарегистрировано в Минюсте России 15.05.2013 N 28409)
| ... **Азитромицин** ... мг ... 500 ... 1500
- 48 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 2 (ред. от 30.12.2022)
"Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
(вместе с "СанПиН 1.2.3685-21. Санитарные правила и нормы...") (Зарегистрировано в Минюсте России 29.01.2021 N 62296)
| 317. ... 9-Деоксо-9а-аза-9а-метил-9а-гомоэритромицин (**азитромицин**) ... 83905-01-5 ...
| С38Н72N2O12 ... 0,000019 ... с.-т. ... 1
- 49 Приказ Минздрава России от 14.06.2022 N 409н
"Об утверждении стандарта медицинской помощи детям при бронхите (диагностика и лечение) и о внесении изменений в стандарт специализированной медицинской помощи детям при острых респираторных заболеваниях тяжелой степени тяжести, утвержденный приказом Минздрава России (Зарегистрировано в Минюсте России 31.08.2022 N 69872)
| ... **Азитромицин** ... 0,033 ... мг ... 400 ... 1 200
- 50 Приказ Минздрава России от 24.12.2012 N 1380н (ред. от 14.06.2022)
"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи детям при хронической бактериальной инфекции"
(Зарегистрировано в Минюсте России 18.02.2013 N 27145)
| ... **Азитромицин** ... г ... 0,5 ... 2,5