

Поиск по "Цефазолин"

- 1 ["МУК 4.1.2445-09. 4.1. Методы контроля. Химические факторы. Измерение массовых концентраций \(6R-транс\)-3-\[\[\[\(5-метил-1,3,4-тиадиазол-2-ил\)тио\]метил\]-8-оксо-7-\[\(1H-тетразол-1-илацетил\)амино\]-5-тиа-1азабицикло\[4.2.0\]окт-2-ен-карбоновой кислоты моноватриевой соли \(утв. Роспотребнадзором 27.01.2009\)](#)
- 2 ["КонсультантПлюс: Новости для специалиста организации здравоохранения"](#)
 - | Скорректировали перечень лекарств. В него вошли **цефазолин**, цефтриаксон, кеторолак и др.
- 3 ["Пояснения к единой Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Содружества Независимых Государств \(ТН ВЭД СНГ\)"](#)

(утв. решением Совета руководителей таможенных служб государств - участников Содружества Независимых Государств от 14.06.2017 N 10/65) (Том 2. Разделы VI (2/2) - VIII. Группы 29 - 43)

 - | Однако в данную субпозицию не включаются другие антибиотики, содержащие бета-лактамовое кольцо, такие как цефалоспорины (например, **цефазолин** (INN), цефаклор (INN)), цефамицины (например, цефокситин (INN)), оксацефемы, пенемы, карбапенемы и т.п.
- 4 ["Пояснения к единой Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза \(ТН ВЭД ЕАЭС\)"](#)

(ред. от 03.12.2019) (Том II. Разделы VI - VIII. Группы 29 - 43)

 - | Однако в данную субпозицию не включаются другие антибиотики, содержащие бета-лактамовое кольцо, такие как цефалоспорины (например, **цефазолин** (INN), цефаклор (INN)), цефамицины (например, цефокситин (INN)), оксацефемы, пенемы, карбапенемы и т.п.
- 5 ["Государственный реестр лекарственных средств"](#)

(по состоянию на 08.09.2023) (Часть 2)

 - | **Цефазолин****Цефазолин**
- 6 ["Государственный реестр лекарственных средств"](#)

(по состоянию на 08.09.2023) (Часть 1)

 - | **Цефазолин****Цефазолин**
- 7 Справочная информация:
["Санитарно-эпидемиологическое нормирование"](#)

(Материал подготовлен специалистами КонсультантПлюс)

 - | Методические указания МУК 4.1.2445-09 "Измерение массовых концентраций (6R-транс)-3-[[[(5-метил-1,3,4-тиадиазол-2-ил)тио]метил]-8-оксо-7-[(1H-тетразол-1-илацетил)амино]-5-тиа-1азабицикло[4.2.0]окт-2-ен-карбоновой кислоты моноватриевой соли (**ЦЕФАЗОЛИНА**

8 [Постановление Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 26.07.2022 по делу N А57-546/2022](#)

Требование: О взыскании денежных средств в счет возмещения ущерба в результате нарушения законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров для обеспечения государственных и муниципальных нужд, штрафа в связи с ненадлежащим исполнением государственного контракта.

Решение: Требование удовлетворено в части.

Таким образом, истец считает, что в нарушение требований статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон N 44-ФЗ), поставщиком - ООО "Йотта-Фарм" в рамках исполнения государственного контракта N 0860200000819008463_260618, заключенного с ГУЗ "Клинический перинатальный центр

9 [Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 14.09.2021 N 80 \(ред. от 29.08.2023\) "Об утверждении единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза и Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза, а также об изменении и признании утратившими силу некоторых решений Совета](#)

... 3004 20 000 1 ... --- содержащие в качестве основного действующего вещества только: амикацин или гентамицин, или гризеофульвин, или доксициклин, или доксорубицин, или канамицин, или кислоту фузидиевую и ее натриевую соль, или левомецетин (хлорамфеникол) и

10 [Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 14.10.2015 N 59 \(ред. от 29.08.2023\) "О перечне товаров, в отношении которых Республикой Казахстан в соответствии с обязательствами, принятыми в качестве условия присоединения к Всемирной торговой организации, применяются ставки ввозных таможенных пошлин, более низкие по сравнению со ставками пошлин Единого](#)

3004 20 000 1 ... --- содержащие в качестве основного действующего вещества только: амикацин или гентамицин, или гризеофульвин, или доксициклин, или доксорубицин, или канамицин, или кислоту фузидиевую и ее натриевую соль, или левомецетин (хлорамфеникол) и его соли, или

11 [Решение Высшего Евразийского экономического совета от 08.05.2015 N 16 \(ред. от 12.05.2022\) "О перечне чувствительных товаров, в отношении которых решение об изменении ставки ввозной таможенной пошлины принимается Советом Евразийской экономической комиссии"](#)

3004 20 000 1 ... --- содержащие в качестве основного действующего вещества только: амикацин или гентамицин, или гризеофульвин, или доксициклин, или доксорубицин, или канамицин, или кислоту фузидиевую и ее натриевую соль, или левомецетин (хлорамфеникол) и его соли, или

- 12 ["Протокол об условиях и переходных положениях по применению Кыргызской Республикой Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, отдельных международных договоров, входящих в право Евразийского экономического союза, и актов органов Евразийского](#)
[\(Подписан в г. Москве 08.05.2015\) \(ред. от 19.04.2022\)](#)
- 3004 20 000 1 ...--- содержащие в качестве основного действующего вещества только: амикацин или гентамицин, или гризеофульвин, или доксициклин, или доксорубицин, или канамицин, или кислоту фузидиевую и ее натриевую соль, или левомецетин (хлорамфеникол) и его соли, или
- 13 Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 05.04.2022 N 46
["Об установлении ставок ввозных таможенных пошлин Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза в отношении отдельных видов товаров, а также о внесении изменений в некоторые решения Комиссии Таможенного союза и Совета Евразийской экономической комиссии"](#)
- ... 3004 20 000 1 ...--- содержащие в качестве основного действующего вещества только: амикацин или гентамицин, или гризеофульвин, или доксициклин, или доксорубицин, или канамицин, или кислоту фузидиевую и ее натриевую соль, или левомецетин (хлорамфеникол) и
- 14 Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 22.01.2019 N 10 (ред. от 21.09.2021)
["О преференциальных ставках ввозных таможенных пошлин в отношении товаров, происходящих из Исламской Республики Иран и ввозимых на таможенную территорию Евразийского экономического союза"](#)
- 3004 20 000 1 ...--- содержащие в качестве основного действующего вещества только: амикацин или гентамицин, или гризеофульвин, или доксициклин, или доксорубицин, или канамицин, или кислоту фузидиевую и ее натриевую соль, или левомецетин (хлорамфеникол) и его соли, или
- 15 ["Договор о присоединении Республики Армения к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года"](#)
[\(Подписан в г. Минске 10.10.2014\) \(ред. от 14.04.2020\)](#)
- 3004 20 000 1 ...--- содержащие в качестве основного действующего вещества только: амикацин или гентамицин, или гризеофульвин, или доксициклин, или доксорубицин, или канамицин, или кислоту фузидиевую и ее натриевую соль, или левомецетин (хлорамфеникол) и его соли, или
- 16 Приказ Минтранса России от 03.06.2014 N 148
["Об утверждении требований к подготовке авиационного персонала органов и служб единой системы авиационно-космического поиска и спасания в Российской Федерации, а также авиационных сил поиска и спасания к проведению поисково-спасательных операций \(работ\), а](#)
[\(Зарегистрировано в Минюсте России 30.10.2014 N 34534\)](#)
- 45 ... **Цефазолин** для инъекций 1,0 ... флакон ... 5

- 17 Приказ Росгидромета от 09.01.2014 N 1
"Об утверждении норм обеспечения бесплатным питанием, вещевым довольствием и лекарственными средствами лиц, входящих в состав Российской антарктической экспедиции"
(Зарегистрировано в Минюсте России 28.02.2014 N 31460)
- J01DB ... **Цефазолин** ... порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения 1 г ... флакон ... 1 ... 125 ... 20 ... 15
- 18 Распоряжение Правительства РФ от 12.10.2019 N 2406-р (ред. от 09.06.2023)
<Об утверждении перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, а также перечней лекарственных препаратов для медицинского применения и минимального ассортимента лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи>
- J01DB ... цефалоспорины 1-го поколения ... **цефазолин** ... порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения; ... порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения; ... порошок для приготовления раствора для инъекций
- 19 "Клинические рекомендации "Инфекции амниотической полости и плодных оболочек (хориоамнионит)"
(утв. Минздравом России)
- ...Препаратами выбора являются //ампициллин** или //цефазолин** в сочетании с //гентамицином**. Схемы терапии: (1) //ампициллин** 2 г внутривенно каждые 6 ч + //гентамицин** 5 мг/кг внутривенно каждые 24 ч или 2 мг/кг и далее 1,5 мг/кг каждые 8 ч...
- 20 "Клинические рекомендации "Саркомы костей"
(утв. Минздравом России)
- Препараты, рекомендованные при проведении превентивной антибактериальной терапии:
Цефазолин**, Амоксициллин + клавулоновая кислота**, Ампициллин + Сульбактам, Цефуроксим**.
- 21 "Клинические рекомендации "Острый гепатит С (ОГС) у взрослых"
(утв. Минздравом России)
- ...выраженном холестатическом синдроме и длительной гипербилирубинемии всегда имеют место поражения желчевыводящих путей (холангита, холецистита, перехолецистита), требующие антибактериальной терапии: другие бета-лактамы антибактериальные препараты (**цефазолин****
- 22 "Клинические рекомендации "Переломы проксимального отдела бедренной кости"
(утв. Минздравом России)
- В качестве основных препаратов для периоперационной антибиотикопрофилактики инфекции в области хирургического вмешательства при проведении хирургического лечения пациентов с ППОБК рекомендуется использовать **цефазолин**** [1], препаратами резерва (например при

- 23 "Клинические рекомендации "Инфекционный эндокардит и инфекция внутрисердечных устройств"
(утв. Минздравом России)
- Комментарий: #Ванкомицин** гораздо менее эффективен в отношении стафилококков, чем #оксациллин** или **цефазолин**** (при наличии чувствительности) и не должен рутинно назначаться в таком случае.
- 24 "Клинические рекомендации "Острый гепатит А (ГА) у взрослых"
(утв. Минздравом России)
- Комментарии: при выраженном холестатическом синдроме и длительной гипербилирубинемии всегда имеют место поражения желчевыводящих путей (холангита, холецистита, перехолецистита), требующие антибактериальной терапии: цефалоспорин (**цефазолин**** или
- 25 "Клинические рекомендации "Переломы костей голени"
(утв. Минздравом России)
- периоперационная антибиотикопрофилактика (при продолжительных операциях введение за 30 мин. до операции **цефазолина**** 1,0 г, 0,5 - 1,0 г во время операции и в течение 24 часов по 0,5 - 1,0 г каждые 6 - 8 часов; при риске развития инфекции введение препарата продолжается...
- 26 "Клинические рекомендации "Острый гепатит В (ГВ) у взрослых"
(утв. Минздравом России)
- ...холестатическом синдроме и длительной гипербилирубинемии всегда имеют место поражения желчевыводящих путей (холангита, холецистита, перехолецистита), требующие антибактериальной терапии: другие бета-лактамы антибактериальные препараты (**цефазолин****
- 27 "Клинические рекомендации "Синдром гиперстимуляции яичников"
(утв. Минздравом России)
- Антибиотиками выбора служат ампициллин** или амоксициллин + клавулановая кислота**, или **цефазолин**** или цефуроксим**. При аллергии на бета-лактамы антибактериальные препараты возможно назначение макролидов.
- 28 "Клинические рекомендации "Гонартроз"
(утв. Минздравом России)
- Рекомендуется выбор препаратов для периоперационной антибиотикопрофилактики (ПАП) основывать на наличии их активности в отношении наиболее вероятных возбудителей инфекции области хирургического вмешательства при конкретной операции, чаще всего применяют
- 29 "Клинические рекомендации "Коксартроз"
(утв. Минздравом России)
- Рекомендуется выбор препаратов для периоперационной антибиотикопрофилактики (ПАП) основывать на наличии их активности в отношении наиболее вероятных возбудителей инфекции области хирургического вмешательства при конкретной операции, чаще всего применяют

30 "Клинические рекомендации "Кистозный фиброз (муковисцидоз)"

(утв. Минздравом России)

P. aeruginosa природно устойчива к ампициллину, амоксициллин/клавулановой кислоте, **цефазолину****, цефалексину**, цефалотину, цефадроксилу, цефотаксиму**, цефтриаксону**, эртапенему**, хлорамфениколу**, канамицину**, неомицину, триметоприму, тетрациклину,

31 "Клинические рекомендации "Экзема"

(утв. Минздравом России)

#**цефазолин**** 1 г внутримышечно 2 раза в сутки в течение 7 - 10 дней [73]

32 "Клинические рекомендации "Внебольничная пневмония у взрослых"

(утв. Минздравом России)

Цефалоспорины III поколения с антисинегнойной активностью (например, цефтазидим**) используются при инфицировании P. aeruginosa; **цефазолин**** может назначаться при ВП, вызванной метициллин-чувствительным S. aureus [1, 33, 91].

33 "Клинические рекомендации "Перелом нижней челюсти"

(утв. Минздравом России)

<2> При массе тела пациента менее 80 кг - доза **Цефазолина**** 1 г, при массе от 80 кг до 130 кг - 2 г, при массе тела более 130 кг - 3 г.

34 "Клинические рекомендации "Роды одноплодные, родоразрешение путем кесарева сечения"

(утв. Минздравом России)

...не проводить антибиотикопрофилактику [233 - 240]. <65> С точки зрения эффективности и безопасности наиболее приемлемыми для антибиотикопрофилактики препаратами являются цефалоспорины I - II поколения (**цефазолин****, цефуросксим**) и комбинации пенициллинов,

35 "Клинические рекомендации "Роды одноплодные, самопроизвольное родоразрешение в затылочном предлежании (нормальные роды)"

(утв. Минздравом России)

...бета-лактамы антибактериальные препараты: пенициллины): #ампициллин** внутривенно первая доза 2000 мг, затем по 1000 мг каждые 4 часа до окончания родов или **цефазолин**** внутривенно первая доза 2000 мг, затем 1000 мг каждые 8 часов до окончания родов [60], [61], в

36 "Клинические рекомендации "Кисты челюстно-лицевой области и шеи"

(утв. Минздравом России)

Для операций в области головы и шеи оптимальными препаратами принято считать: Цефалоспорины I - II поколений: **цефазолин** (J01DB04Cefazolin) в/в, 1,0 г за 0,5 - 1 час. до операции, 0,5 - 1,0 г - во время операции и по 0,5...

- 37 ["Клинические рекомендации "Перелом верхней челюсти"](#)
(утв. Минздравом России)
| b при массе тела пациента менее 80 кг - доза **цефазолин**** 1 г, при массе от 80 кг до 130 кг - 2 г,
при массе тела более 130 кг - 3 г;
- 38 ["Клинические рекомендации "Перелом скуловой кости"](#)
(утв. Минздравом России)
| <2> при массе тела пациента менее 80 кг - доза **цефазолина** 1 г, при массе от 80 кг до 130 кг - 2 г,
при массе тела более 130 кг - 3 г.
- 39 ["Клинические рекомендации "Рак предстательной железы"](#)
(утв. Минздравом России)
| ...постоянного уретрального катетера, длительный прием стероидных гормональных препаратов, иммунодефицитные состояния, нарушения мочеиспускания) [115] для снижения риска инфекционных осложнений [81, 114, 116 - 118, 120]. Для выполнения трансперинеальной
- 40 Приказ Минздрава России от 29.06.2023 N 331н
["Об утверждении стандарта медицинской помощи взрослым при повреждении мениска коленного сустава \(диагностика и лечение\)"](#)
(Зарегистрировано в Минюсте России 04.08.2023 N 74621)
| ... **Цефазолин** ... 0,45 ... г ... 2 ... 2
- 41 Приказ Минздрава России от 07.06.2023 N 281н
["Об утверждении стандарта медицинской помощи взрослым при паховой грыже \(диагностика, лечение и диспансерное наблюдение\)"](#)
(Зарегистрировано в Минюсте России 13.07.2023 N 74246)
| ... **Цефазолин** ... 0,037 ... г ... 2 ... 2
- 42 Приказ Минздрава России от 23.05.2023 N 258н
["Об утверждении стандарта медицинской помощи взрослым при послеоперационной вентральной грыже \(диагностика, лечение и диспансерное наблюдение\)"](#)
(Зарегистрировано в Минюсте России 29.06.2023 N 74036)
| ... **Цефазолин** ... 0,1 ... г ... 2 ... 2
- 43 Приказ Минздрава России от 25.04.2023 N 192н
["Об утверждении стандартов медицинской помощи взрослым при саркомах костей"](#)
(вместе со "Стандартом медицинской помощи взрослым при саркомах костей (диагностика и лечение)", "Стандартом медицинской помощи взрослым при саркомах костей (диспансерное
| ... **Цефазолин** ... 0,72 ... г ... 3 ... 15

- 44 Приказ Минздрава России от 14.02.2023 N 51н
"Об утверждении стандарта медицинской помощи взрослым при переломах пяточной кости (диагностика, лечение и диспансерное наблюдение)"
(Зарегистрировано в Минюсте России 29.03.2023 N 72770)
| ... **Цефазолин** ... 0,25 ... г ... 2 ... 4
- 45 Приказ Минздрава России от 30.01.2023 N 31н
"Об утверждении стандарта медицинской помощи взрослым при открытой ране запястья и кисти (диагностика и лечение)"
(Зарегистрировано в Минюсте России 02.03.2023 N 72500)
| ... **Цефазолин** ... 0,047 ... г ... 2 ... 14
- 46 Приказ Минздрава России от 16.01.2023 N 11н
"Об утверждении стандарта медицинской помощи взрослым при коксартрозе (диагностика, лечение и диспансерное наблюдение) и о внесении изменения в стандарт первичной медико-санитарной помощи при осложнениях, связанных с внутренними ортопедическими протезными устройствами,
(Зарегистрировано в Минюсте России 20.02.2023 N 72403)
| ... **Цефазолин** ... 0,065 ... г ... 3 ... 15
- 47 Приказ Минздрава России от 09.01.2023 N 4н
"Об утверждении стандарта медицинской помощи взрослым при синдроме гиперстимуляции яичников (диагностика и лечение)"
(Зарегистрировано в Минюсте России 31.01.2023 N 72188)
| ... **Цефазолин** ... 0,00084 ... г ... 3 ... 18
- 48 Приказ Минздрава России от 09.01.2023 N 3н
"Об утверждении стандарта медицинской помощи при истмико-цервикальной недостаточности (диагностика и лечение)"
(Зарегистрировано в Минюсте России 31.01.2023 N 72189)
| ... **Цефазолин** ... 0,01 ... г ... 3 ... 6
- 49 Приказ Минздрава России от 09.01.2023 N 2н
"Об утверждении стандарта медицинской помощи при свершившемся выкидыше (самопроизвольном аборте) и неразвивающейся беременности (диагностика и лечение) и о внесении изменений в стандарт специализированной медицинской помощи при самопроизвольном
(Зарегистрировано в Минюсте России 31.01.2023 N 72190)
| ... **Цефазолин** ... 0,052 ... г ... 3 ... 12

50 "Клинические рекомендации "Оперативные влагалищные роды (Роды одноплодные, родоразрешение с наложением щипцов или с применением вакуум-экстрактора)"
(утв. Минздравом России)

Цефазолин** ... 1 г ... внутривенно медленно