

Поиск по "Цефтриаксон"

- 1 ["КонсультантПлюс: Новости для специалиста организации здравоохранения"](#)
 - | Скорректировали перечень лекарств. В него вошли цефазолин, **цефтриаксон**, кеторолак и др.

- 2 [Постановление Правительства РФ от 14.02.2002 N 103 \(ред. от 01.02.2005\)](#)
["Об утверждении перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств и изделий медицинского назначения для бесплатного приобретения гражданами, постоянно проживающими \(работающими\) на территории зоны проживания с правом на отселение, в соответствии с пунктом](#)
 - | 101. **Цефтриаксон** (порошок для инъекций)

- 3 [Приказ Росстата от 23.12.2022 N 975](#)
["Об утверждении наборов потребительских товаров и услуг и перечня базовых городов Российской Федерации для наблюдения за ценами и тарифами"](#)
 - | 367. **Цефтриаксон**, 1 г, упаковка

- 4 ["Временные методические рекомендации "Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции \(COVID-19\). Версия 17 \(09.12.2022\)"](#)
(утв. Минздравом России) (вместе с "Рекомендациями по описанию данных РГ И КТ ОГК",
"Инструкцией по проведению диагностики COVID-19 с применением методов амплификации)
 - | <2> Цефотаксим должен назначаться в дозе не менее 6 г/сут, **цефтриаксон** - 4 г/сут.

- 5 ["Методические рекомендации "Организация оказания медицинской помощи беременным, роженицам, родильницам и новорожденным при новой коронавирусной инфекции COVID-19. Версия 5 \(28.12.2021\)"](#)
(утв. Минздравом России)
 - | У пациенток в тяжелом состоянии (ОРИТ) рекомендована комбинированная терапия: ингибитор защищенные аминопенициллины (амоксциллин/клавулановая кислота, амоксициллин/сульбактам), цефалоспорины 3 поколения (**цефтриаксон**, цефотаксим) или цефалоспорины 5

- 6 Обзор:
["Специализированную помощь детям с мукополисахаридозом II типа теперь оказывают по новым стандартам"](#)
(КонсультантПлюс, 2019)
 - | Среди новинок - урсодезоксихолевая кислота, гидрохлоротиазид, фуросемид, амоксициллин, **цефтриаксон**, джозамицин, ламотриджин, гидроксизин, аминоксифенмасляная кислота, будесонид.

- 7 ["Государственный реестр лекарственных средств"](#)
(по состоянию на 08.09.2023) (Часть 2)
| **Цефтриаксон КабиЦефтриаксон**
- 8 ["Государственный реестр лекарственных средств"](#)
(по состоянию на 08.09.2023) (Часть 1)
| **Цефтриаксон КабиЦефтриаксон**
- 9 ["Методические рекомендации "Особенности клинических проявлений и лечения заболевания, вызванного новой коронавирусной инфекцией \(COVID-19\) у детей. Версия 2 \(03.07.2020\)"](#)
(утв. Минздравом России)
| - ... при подозрении на внебольничную типичную (пневмококковую) пневмонию назначается амоксициллин; при наличии факторов риска лекарственной устойчивости (госпитализация или лечение антибиотиками в предыдущие 3 месяца, посещении ДДУ больным или сибсом,
- 10 Приказ Росгидромета от 09.01.2014 N 1
["Об утверждении норм обеспечения бесплатным питанием, вещевым довольствием и лекарственными средствами лиц, входящих в состав Российской антарктической экспедиции"](#)
(Зарегистрировано в Минюсте России 28.02.2014 N 31460)
| J01DD ... **Цефтриаксон** ... порошок для приготовления раствора для инъекций 1 г ... Флакон ... 1 ...
75 ... 15 ... 10
- 11 Распоряжение Правительства РФ от 12.10.2019 N 2406-р (ред. от 09.06.2023)
["Об утверждении перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, а также перечней лекарственных препаратов для медицинского применения и минимального ассортимента лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи"](#)
| ... **цефтриаксон** ... порошок для приготовления раствора для внутривенного введения; ... порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения; ... порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения; ... порошок для приготовления раствора
- 12 Распоряжение Правительства РФ от 06.07.2010 N 1141-р (ред. от 01.08.2020)
["Об утверждении перечня стратегически значимых лекарственных средств"](#)
| 197. ... **Цефтриаксон**
- 13 ["Клинические рекомендации "Грипп у взрослых"](#)
(утв. Минздравом России)
| - Рекомендовано проведение терапии антибактериальными препаратами системного действия (ампициллин**, амоксициллин + клавулановая кислота** или ампициллин + сульбактам**, цефалоспорины III поколения (цефотаксим**, **цефтриаксон****), альтернативы - фторхинолоны у

14 "Клинические рекомендации "Инфекции амниотической полости и плодных оболочек (хориоамнионит)"

(утв. Минздравом России)

...1,5 г внутривенно каждые 6 ч. Также для монотерапия назначаются цефалоспорины П-Ш поколения: //цефокситин** 2 г внутривенно каждые 8 ч или **цефтриаксон**** 1 г каждые 24 ч, в тяжелых случаях суточную дозу можно увеличить до 4 г [4, 68, 75, 86 - 89]. При аллергической...

15 "Клинические рекомендации "Менингококковая инфекция у детей"

(утв. Минздравом России)

В настоящее время цефалоспорины 3-го поколения являются препаратами первого выбора и стартовой эмпирической терапии и для ГМИ, и для бактериальных гнойных менингитов у взрослых и детей старше 1 мес. При назначении **цефтриаксона**** необходимо учитывать

16 "Клинические рекомендации "Саркомы костей"

(утв. Минздравом России)

При предполагаемой длительности операции более 6 часов - **Цефтриаксон** 2 гр.

17 "Клинические рекомендации "Инфекция мочевых путей при беременности"

(утв. Минздравом России)

Комментарий: Могут использоваться цефалоспорины второго - третьего поколений (**цефтриаксон****, цефоперазон**).

18 "Клинические рекомендации "Пневмония (внебольничная)"

(утв. Минздравом России)

...отношении которого должна проводиться максимально эффективная АБТ [25]. Устойчивая тенденция, наблюдаемая в течение последних 10 - 15 лет, - повсеместное снижение чувствительности пневмококков к макролидам, а также появление и распространение в

19 "Клинические рекомендации "Острый гепатит С (ОГС) у взрослых"

(утв. Минздравом России)

...выраженном холестатическом синдроме и длительной гипербилирубинемии всегда имеют место поражения желчевыводящих путей (холангита, холецистита, перихолецистита), требующие антибактериальной терапии: другие бета-лактамы антибактериальные препараты (цефазолин**

20 "Клинические рекомендации "Инфекционный эндокардит и инфекция внутрисердечных устройств"

(утв. Минздравом России)

...вызванным группой зеленающего стрептококка или *S. bovis* чувствительными к пенициллину (МПК 0.125 мг/л), рекомендуется рассмотреть возможность проведения АБТ коротким двухнедельным курсом, комбинацией пенициллина широкого спектра действия или

21 "Клинические рекомендации "Брюшной тиф (инфекция, вызванная *Salmonella Typhi*) у взрослых"

(утв. Минздравом России)

...раза в день внутрь или в/в; пefлоксацин по 0,4 г 2 раза в день внутрь) или цефалоспорины 3-го поколения (**цефтриаксон**** - внутримышечно или внутривенно по 1,0 - 2,0 г один раз в сутки или #цефиксим** - внутрь по 400 мг (1 раз в...

22 "Клинические рекомендации "Острый гепатит А (ГА) у взрослых"

(утв. Минздравом России)

Комментарии: при выраженном холестатическом синдроме и длительной гипербилирубинемии всегда имеют место поражения желчевыводящих путей (холангита, холецистита, перехолецистита), требующие антибактериальной терапии: цефалоспорин (цефазолин** или

23 "Клинические рекомендации "Цирроз и фиброз печени"

(утв. Минздравом России)

Цефтриаксон** в дозе 1 г. в сутки является препаратом первой линии для пациентов с декомпенсированным ЦП, пациентов, уже получающих антибактериальные препараты, производные хинолона (фторхинолоны), а также в стационарах с высокой частотой фторхинолон-

24 "Клинические рекомендации "Сальмонеллез у детей"

(утв. Минздравом России)

Комментарии: при наличии показаний назначаются антибактериальные препараты в соответствии с чувствительностью выделенных штаммов, к стартовым препаратам относятся нифуроксазид, #азитромицин** 10 мг/кг веса в сутки 3 - 5 дней, **цефтриаксон**** [12, 13, 30 - 34].

25 "Клинические рекомендации "Сальмонеллез у взрослых"

(утв. Минздравом России)

- Рекомендованы препараты резерва в терапии тяжелых и генерализованных форм сальмонеллеза: нетилмицин, цефотаксим**, **цефтриаксон****, цефтазидим**, рифампицин**, цiproфлоксацин**. [1, 2, 3, 4, 11, 12, 21]

26 "Клинические рекомендации "Серповидно-клеточные нарушения"

(утв. Минздравом России)

...Некоторые антибиотики, такие как **цефтриаксон****, могут способствовать образованию осадка. Исследования у пациентов с СКБ показывают, что в желчном пузыре осадок часто встречается с камнями, но осадок сам по себе может и не прогрессировать в образование камней [42 - 44]. Тем

27 "Клинические рекомендации "Острый гепатит В (ГВ) у взрослых"

(утв. Минздравом России)

...холестатическом синдроме и длительной гипербилирубинемии всегда имеют место поражения желчевыводящих путей (холангита, холецистита, перехолецистита), требующие антибактериальной терапии: другие бета-лактамы антибактериальные препараты (цефазолин**

28 "Клинические рекомендации "Кистозный фиброз (муковисцидоз)"

(утв. Минздравом России)

<1> Цефотаксим**, **цефтриаксон****, цефоперазон, цефоперазон+[Сульбактам]**, цефтазидим**, цефдиторен, цефиксим, цефтибутен, цефепим**, цефпиром и др.

29 "Клинические рекомендации "Желчнокаменная болезнь"

(утв. Минздравом России)

7) Применение лекарственных средств, влияющих на концентрацию холестерина в желчи, моторику желчных путей или способных к кристаллизации в желчи (**цефтриаксон****).

30 "Клинические рекомендации "Острый обструктивный ларингит [круп] и эпиглоттит"

(утв. Минздравом России)

Комментарии: внутривенно Цефотаксим** в дозе 100 - 200 мг/кг/сут или **Цефтриаксон**** в дозе по инструкции 20 - 80 мг/кг/сут, наиболее оправданной считается доза 75 мг/кг/сут (согласно зарубежным публикациям, дозировки **#Цефтриаксона**** при эпиглоттите у детей в диапазоне 50 -

31 "Клинические рекомендации "Острый синусит"

(утв. Минздравом России)

...риносинусита предпочтителен внутримышечный и внутривенный пути введения, целесообразно назначение парентеральных цефалоспоринов 3-его поколения: цефотаксима** (Код АТХ: J01DD01) или **цефтриаксона**** (Код АТХ: J01DD04). При условии внутривенного введения возможно

32 "Клинические рекомендации "Мочекаменная болезнь"

(утв. Минздравом России)

- **Цефтриаксон****

33 "Клинические рекомендации "Отит средний острый"

(утв. Минздравом России)

...пациентов предпочтителен внутримышечный и внутривенный пути введения антибиотиков, целесообразно назначение парентеральных цефалоспоринов 3-его поколения: цефотаксима** (Код АТХ: J01DD01) или **цефтриаксона**** (Код АТХ: J01DD04). При условии внутривенного введения

34 "Клинические рекомендации "Экзема"

(утв. Минздравом России)

#цефтриаксон** 1 - 2 г внутримышечно или внутривенно 1 раз в сутки в течение 7 - 10 дней [73]

35 "Клинические рекомендации "Атопический дерматит"

(утв. Минздравом России)

цефтриаксон** - по 1 - 2 г в сутки внутримышечно или внутривенно детям старше 12 лет (желательно в 2 введения через 12 часов), новорожденным до 2 нед - 20 - 50 мг/кг/сут, детям от 3 нед до 12 лет - 20 - 80 мг/кг/сут в 2 введения...

36 "Клинические рекомендации "Внебольничная пневмония у взрослых"

(утв. Минздравом России)

Частота выявления *S. pneumoniae*, резистентных к **цефтриаксону****, составила 5,4%. Большинство пневмококков, включая пенициллинорезистентные (ПРП), сохраняют чувствительность к цефтаролина фосамилу**, все - к линезолиду**, ванкомицину**.

37 "Клинические рекомендации "Гонококковая инфекция"

(утв. Минздравом России)

цефтриаксон** 500 мг внутримышечно однократно [12 - 15, 19].

38 "Клинические рекомендации "Сифилис"

(утв. Минздравом России)

4. Цефалоспорины: **#Цефтриаксон****.

39 "Клинические рекомендации "Мочекаменная болезнь"

(утв. Минздравом России)

Комментарии: лекарственные препараты, кристаллизующиеся в моче - Аллопуринол**, Амоксициллин**, **Цефтриаксон****, Фторхинолоны, Эфедрин, Индинавир, Сульфаниламиды, Триамтерен (в составе препарата Гидрохлортиазид + Триамтерен), Зонисамид.

40 <Письмо> Минздрава России от 06.03.2020 N 30-4/И/2-2702

<О направлении алгоритма оказания медицинской помощи взрослому населению с внебольничными пневмониями>

...Амоксициллин/клавуланат 1,2 г в/в 3 раза в день или ампициллин/сульбактам 1,5 г 4 раза в день, например, **цефтриаксон** 2,0 г в/в 1 - 2 раз в день или цефотаксим 2,0 г в/в 2 - 3 р/день), Левофлоксацин...

41 Приказ Минздрава России от 29.06.2023 N 331н

"Об утверждении стандарта медицинской помощи взрослым при повреждении мениска коленного сустава (диагностика и лечение)"

(Зарегистрировано в Минюсте России 04.08.2023 N 74621)

... **Цефтриаксон** ... 0,45 ... мг ... 1 500 ... 1 500

- 42 Приказ Росгвардии от 26.05.2023 N 175
"Об установлении особенностей оснащения аптек, сумок и комплектов медицинского имущества в войсках национальной гвардии Российской Федерации"
(Зарегистрировано в Минюсте России 30.06.2023 N 74085)
7 ... Антибактериальное средство широкого спектра действия (**цефтриаксон**, цефотаксим или аналог) во флаконах с растворителем ... 5 флаконов
- 43 Приказ Минздрава России от 28.10.2020 N 1165н (ред. от 13.04.2023)
"Об утверждении требований к комплектации лекарственными препаратами и медицинскими изделиями укладок и наборов для оказания скорой медицинской помощи"
(Зарегистрировано в Минюсте России 26.11.2020 N 61099)
1.20.1 ... J01DD04 ... **цефтриаксон** ... **цефтриаксон** ... порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения
- 44 Приказ Минздрава России от 14.02.2023 N 51н
"Об утверждении стандарта медицинской помощи взрослым при переломах пяточной кости (диагностика, лечение и диспансерное наблюдение)"
(Зарегистрировано в Минюсте России 29.03.2023 N 72770)
... **Цефтриаксон** ... 0,25 ... мг ... 1 500 ... 1 500
- 45 Приказ Минздрава России от 30.01.2023 N 31н
"Об утверждении стандарта медицинской помощи взрослым при открытой ране запястья и кисти (диагностика и лечение)"
(Зарегистрировано в Минюсте России 02.03.2023 N 72500)
... **Цефтриаксон** ... 0,047 ... мг ... 1 500 ... 10 500
- 46 Приказ Минздрава России от 26.01.2023 N 28н
"Об утверждении стандарта первичной медико-санитарной помощи взрослым при наружных отитах (диагностика и лечение)"
(Зарегистрировано в Минюсте России 20.02.2023 N 72417)
... **Цефтриаксон** ... 0,098 ... г ... 2 ... 14
- 47 Приказ Минздрава России от 07.11.2012 N 590н (ред. от 09.01.2023)
"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при самопроизвольном прерывании беременности"
(Зарегистрировано в Минюсте России 15.05.2013 N 28409)
... **Цефтриаксон** ... мг ... 2000 ... 6000

- 48 Приказ Минздрава России от 06.10.2022 N 650н
"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи взрослым при острой неопухолевой кишечной непроходимости (диагностика и лечение)"
(Зарегистрировано в Минюсте России 09.11.2022 N 70868)
| ... **Цефтриаксон** ... 0,03 ... г ... 2 ... 20
- 49 Приказ Минздрава России от 05.10.2022 N 648н
"Об утверждении стандарта медицинской помощи взрослым при отморожении, гипотермии, других эффектах воздействия низкой температуры (диагностика и лечение)"
(Зарегистрировано в Минюсте России 09.11.2022 N 70867)
| ... **Цефтриаксон** ... 0,26 ... г ... 2 ... 18
- 50 Приказ Минздрава России от 04.10.2022 N 646н
"Об утверждении стандарта медицинской помощи взрослым при ожогах термических и химических, ожогах солнечных, ожогах дыхательных путей (диагностика и лечение)"
(Зарегистрировано в Минюсте России 09.11.2022 N 70871)
| ... **Цефтриаксон** ... 0,14 ... г ... 2 ... 14