

## Поиск по "Эпинефрин"

- 1 ["Пояснения к единой Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Содружества Независимых Государств \(ТН ВЭД СНГ\)"](#)  
(утв. решением Совета руководителей таможенных служб государств - участников Содружества Независимых Государств от 14.06.2017 N 10/65) (Том 2. Разделы VI (2/2) - VIII. Группы 29 - 43)
  - (а) **Эпинефрин** (INN) (адреналин или (-)-3,4-дигидрокси--[метиламино]метил]бензиловый спирт) и рацепинефрин (INN) (()-3,4-дигидрокси--[метиламино]метил]бензиловый спирт).
- 2 Постановление Правительства РФ от 14.02.2002 N 103 (ред. от 01.02.2005)  
["Об утверждении перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств и изделий медицинского назначения для бесплатного приобретения гражданами, постоянно проживающими \(работающими\) на территории зоны проживания с правом на отселение, в соответствии с пунктом](#)
  - 315. **Эпинефрин** (раствор для инъекций)
- 3 ["Временные методические рекомендации "Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции \(COVID-19\). Версия 17 \(09.12.2022\)"](#)  
(утв. Минздравом России) (вместе с "Рекомендациями по описанию данных РГ И КТ ОГК",  
"Инструкцией по проведению диагностики COVID-19 с применением методов амплификации  
обозначения: Доф - дофамин, Доб - добутамин, Эпи - **эпинефрин** (адреналин), Нор - норэпинефрин (норадреналин).
- 4 ["Пояснения к единой Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза \(ТН ВЭД ЕАЭС\)"](#)  
(ред. от 03.12.2019) (Том II. Разделы VI - VIII. Группы 29 - 43)
  - (а) **Эпинефрин** (INN) (адреналин или (-)-3,4-дигидрокси--[метиламино]метил]бензиловый спирт) и рацепинефрин (INN) (()-3,4-дигидрокси--[метиламино]метил]бензиловый спирт).
- 5 Обзор:  
["Основные изменения законодательства в 2019 году для организаций здравоохранения"](#)  
(КонсультантПлюс, 2018)
  - ампулы трамадола, **эпинефрина**, клемастина, диазепам.
- 6 ["Государственный реестр лекарственных средств"](#)  
(по состоянию на 08.09.2023) (Часть 2)
  - Артикаин+[**Эпинефрин**]

- 7 ["Государственный реестр лекарственных средств"](#)  
(по состоянию на 08.09.2023) (Часть 1)  
| Артикаин+**[Эпинефрин]**
- 8 Решение Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 N 299 (ред. от 29.08.2023)  
["О применении санитарных мер в Евразийском экономическом союзе"](#)  
| 14. **Эпинефрин** ... Epinephrine
- 9 Решение Комиссии Таможенного союза от 23.09.2011 N 799 (ред. от 15.04.2022)  
["О принятии технического регламента Таможенного союза "О безопасности парфюмерно-косметической продукции"](#)  
(вместе с "ТР ТС 009/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности парфюмерно-косметической продукции")  
| 14 ... **Эпинефрин** (INN) ... Epinephrine (INN) ... 51-43-4 ... 200-098-7
- 10 ["Методические рекомендации "Особенности клинических проявлений и лечения заболевания, вызванного новой коронавирусной инфекцией \(COVID-19\) у детей. Версия 2 \(03.07.2020\)"](#)  
(утв. Минздравом России)  
| Начать инфузию **эпинефрина** 0,05 - 0,3 мкг/кг/мин. Использовать атропин, кетамин для катетеризации центральной вены.
- 11 Приказ МЧС России от 15.12.2002 N 583 (ред. от 26.06.2018)  
["Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны"](#)  
(Зарегистрировано в Минюсте России 25.03.2003 N 4317)  
| 65. ... **Эпинефрин**, раствор для инъекций, 1 мг/мл, 1 мл в ампуле <\*> ... амп. ... 5
- 12 Приказ Минтранса России от 03.06.2014 N 148  
["Об утверждении требований к подготовке авиационного персонала органов и служб единой системы авиационно-космического поиска и спасания в Российской Федерации, а также авиационных сил поиска и спасания к проведению поисково-спасательных операций \(работ\), а](#)  
(Зарегистрировано в Минюсте России 30.10.2014 N 34534)  
| 48 ... **Эпинефрина** гидрохлорид (адреналин) 0,1% р-р 1 мл ... ампула ... 10
- 13 Приказ Росгидромета от 09.01.2014 N 1  
["Об утверждении норм обеспечения бесплатным питанием, вещевым довольствием и лекарственными средствами лиц, входящих в состав Российской антарктической экспедиции"](#)  
(Зарегистрировано в Минюсте России 28.02.2014 N 31460)  
| С01СА ... **Эпинефрин** ... раствор для инъекций, ампула 1 мг/мл 1 мл N 5 ... упаковка ... 1 ... 20 ... 3 ...  
3

- 14 [Распоряжение Правительства РФ от 12.10.2019 N 2406-р \(ред. от 09.06.2023\)](#)  
[<Об утверждении перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, а также перечней лекарственных препаратов для медицинского применения и минимального ассортимента лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи>](#)  
| ... **эпинефрин** ... раствор для инъекций
- 15 [Распоряжение Правительства РФ от 06.07.2010 N 1141-р \(ред. от 01.08.2020\)](#)  
[<Об утверждении перечня стратегически значимых лекарственных средств>](#)  
| 208. ... **Эпинефрин**
- 16 ["Клинические рекомендации "Крапивница"](#)  
(утв. Минздравом России)  
| ...случае, когда крапивница и/или ангиоотек являются симптомом анафилаксии, показана соответствующая терапия (см. клинические рекомендации "Анафилактический шок"). Пациентам с хронической индуцированной крапивницей, перенесшим анафилаксию, необходимо иметь при
- 17 ["Клинические рекомендации "Трансплантация сердца, наличие трансплантированного сердца, отмирание и отторжение трансплантата сердца"](#)  
(утв. Минздравом России)  
| При гемодинамически значимом нарушении сократительной функции сердечного трансплантата рекомендован базовый препарат **эпинефрин**\*\* (изолированно или в комбинации с другими адренергическими и дофаминергическими средствами).
- 18 ["Клинические рекомендации "Коарктация аорты"](#)  
(утв. Минздравом России)  
| ...от 2,5 мкг/кг/мин с последующим титрованием дозы до получения желаемого эффекта); при недостаточной эффективности вышеописанных препаратов, необходимо дополнительное назначение **#эпинефрина**\*\* (в начальной дозе 0,01 мкг/кг/мин с последующим титрованием дозы
- 19 [Приказ Минспорта России от 18.11.2022 N 1013](#)  
["Об утверждении перечней субстанций и \(или\) методов, запрещенных для использования в спорте"](#)  
(Зарегистрировано в Минюсте России 21.12.2022 N 71723)  
| ...моче превышает 150 мкг/мл); селегилин; сибутрамин; солриамфетол; стрихнин; тенамфетамин (метилен-диоксиамфетамин); туаминогептан; фампрофазон; фенбутразат; фенилэтиламин и его производные; фенкамфамин; фенметразин; фенпрометамин; **эпинефрин** (адреналин) (не
- 20 ["Клинические рекомендации "Врожденный клапанный стеноз аорты"](#)  
(утв. Минздравом России)  
| Комментарии: Для лечения острой сердечной недостаточности на фоне критического КСА используется **#левосимендан**\*\*, обладающий положительным инотропным и вазодилатирующим эффектом, что приводит к увеличению силы сердечных сокращений и снижению как пред-, так и

- 21 "Клинические рекомендации "Врожденная митральная недостаточность (ВМН)"  
(утв. Минздравом России)
- Нитропрусида натрия дигидрат (C02DD01) вводится внутривенно инфузионно в дозе 0,3 - 4 мкг/кг/мин (при гипотонии - в сочетании с инотропной поддержкой - C01CA24/**Эпинефрин\*\***) [72 - 94].
- 22 "Клинические рекомендации "Черепно-мозговая травма у детей"  
(утв. Минздравом России)
- Основной препарат, применяемый при сердечной реанимации **эпинефрин\*\*** код АТХ C01CA24. При отсутствии доступа к сосудистому руслу возможно эндотрахеальное введение препаратов или однократно в корень языка [11]
- 23 "Клинические рекомендации "Очаговая травма головного мозга"  
(утв. Минздравом России)
- При недостаточной эффективности инфузионной терапии для повышения ЦПД рекомендовано применять адренергические и дофаминергические средства (норэpineфрин\*\*, фенилэфрин\*\*, допамин\*\*, **эпинефрин\*\***).
- 24 "Клинические рекомендации "Дефект предсердно-желудочковой перегородки (Атриовентрикулярный канал)"  
(утв. Минздравом России)
- ...дозах от 2 мкг/кг/мин с последующим титрованием дозы до получения желаемого эффекта); при недостаточной эффективности вышеописанных препаратов, необходимо дополнительное назначение **#эпинефрина\*\*** (в начальной дозе 0,01 мкг/кг/мин с последующим титрованием дозы
- 25 "Клинические рекомендации "Тотальный аномальный дренаж легочных вен"  
(утв. Минздравом России)
- Повышение количества лейкоцитов (лейкоцитоз) - воспалительные процессы, острые бактериальные, грибковые, вирусные инфекции, коматозные состояния, гемолитический криз, уремия, медикаменты (-**эпинефрин\*\***, половые гормоны и модуляторы функций половых органов).
- 26 "Клинические рекомендации "Нарушения митохондриального бета-окисления жирных кислот"  
(утв. Минздравом России)
- В случае необходимости введения **эпинефрина\*\*** всем пациентам с FAOD рекомендовано его введение вместе с 10% раствором декстрозы\*\* [97, 151].
- 27 "Клинические рекомендации "Отморожение. Гипотермия. Другие эффекты воздействия низкой температуры."  
(утв. Минздравом России)
- При температуре тела у пострадавшего ниже 30 °С отмечается рефрактерность брадикардии к атропину\*\*, снижен метаболизм **эпинефрина\*\*** и активность адренергических рецепторов, что может привести к токсическому эффекту.

- 28 "Клинические рекомендации "Острый обструктивный ларингит [круп] и эпиглоттит"  
(утв. Минздравом России)
- При тяжелом крупе или отсутствии глюкокортикоидов возможно рекомендовать ингаляционное применение **#Эпинефрина\*\*** [6].
- 29 "Клинические рекомендации "Внематочная (эктопическая) беременность"  
(утв. Минздравом России)
- Регуляция параметров гемодинамики при необходимости осуществляется ранним применением вазопрессоров (по АТХ - Адренергические и дофаминергические средства) (норэпинефрин\*\*, **эпинефрин\*\***, допамин\*\*, фенилэфрин\*\*).
- 30 "Клинические рекомендации "Роды одноплодные, родоразрешение путем кесарева сечения"  
(утв. Минздравом России)
- Рекомендовано раннее введение **эпинефрина\*\*** при реанимационных мероприятиях по поводу остановки сердца на фоне спинальной анестезии, что способствует повышению выживаемости [166, 167].
- 31 "Клинические рекомендации "Бронхиальная астма"  
(утв. Минздравом России)
- Подкожное или внутримышечное введение **эпинефрина\*\*** рекомендуется при неотложном лечении анафилаксии или ангионевротического отека [133, 134].
- 32 "Клинические рекомендации "Наследственный ангиоотек"  
(утв. Минздравом России)
- Пациентам с НАО I и II типов настоятельно не рекомендуется назначение сГКС, **эпинефрина\*\***, антигистаминных препаратов для системного применения для купирования любых видов отеков. [94]
- 33 "Клинические рекомендации "Анафилактический шок"  
(утв. Минздравом России)
- Рекомендуется всем пациентам с анафилаксией/АШ незамедлительно ввести **эпинефрин\*\*** для купирования анафилаксии/АШ [13, 35].
- 34 "Клинические рекомендации "Миокардиты"  
(утв. Минздравом России)
- В отечественной практике чаще других назначаются допамин\*\* и **эпинефрин\*\*** (Адренергические и дофаминергические средства С01СА03). Стратегия выбора доз допамина\*\* основана на следующем: допамин\*\* в малых дозах (1 - 3 мкг/кг/мин) оказывает дофаминергический эффект и

35 "Клинические рекомендации "Желудочковые нарушения ритма. Желудочковые тахикардии и внезапная сердечная смерть"

(утв. Минздравом России)

Проба с **эпинефрином**. Позволяет выявить больных СУИQT1, поскольку при этой форме заболевания при проведении инфузии **эпинефрина** отмечается парадоксальное увеличение длительности интервала QT. Проба расценивается как положительная при увеличении

36 "Клинические рекомендации "Наджелудочковые тахикардии"

(утв. Минздравом России)

Неселективные бета-адреноблокаторы предпочтительнее, поскольку дополнительно блокируют **эпинефрин**-опосредованную бета-2-вазодилатацию, однако опыт их применения ограничен.

37 "Клинические рекомендации "Острый инфаркт миокарда с подъемом сегмента ST электрокардиограммы"

(утв. Минздравом России)

- У пациентов с ИМпST при гемодинамически значимой синусовой брадикардии или АВ-блокаде с неадекватным замещающим ритмом для стабилизации гемодинамики рекомендуется внутривенное введение препаратов, оказывающих позитивное хронотропное действие

38 "Клинические рекомендации "Острая интоксикация психоактивными веществами"

(утв. Минздравом России)

При одновременном применении с **эпинефрином** возможно "извращение" прессорного действия **эпинефрина**, и в результате этого - развитие тяжелой артериальной гипотензии и тахикардии.

39 "Клинические рекомендации "Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением психоактивных веществ. Психотическое расстройство"

(утв. Минздравом России)

При одновременном применении с **эпинефрином** возможно "извращение" прессорного действия **эпинефрина**, и в результате этого - развитие тяжелой артериальной гипотензии и тахикардии.

40 "Клинические рекомендации "Рак яичников/рак маточной трубы/первичный рак брюшины"

(утв. Минздравом России)

Должен быть обеспечен быстрый доступ к необходимым препаратам (блокаторы H1-гистаминовых рецепторов, глюкокортикоиды, **эпинефрин**) и/или к реанимационной службе.

- 41 Приказ Минздрава России от 03.08.2023 N 409н  
"Об утверждении перечня медицинских изделий для оснащения (дооснащения) региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений, имеющих в структуре медицинских организаций, подведомственных исполнительным органам Донецкой Народной Республики, (Зарегистрировано в Минюсте России 07.08.2023 N 74654)
25. ... Мобильный (переносной) набор для проведения реанимационных мероприятий в других отделениях, включающий воздуховод, аппарат для ручной искусственной вентиляции легких, наружный ручной дефибриллятор с возможностью контроля проведения электрокардиографии с
- 42 <Письмо> Минздрава России от 26.01.2023 N 31-2/И/2-1075 (ред. от 11.05.2023)  
"О методических рекомендациях по способам оплаты медицинской помощи за счет средств обязательного медицинского страхования"  
(вместе с "Методическими рекомендациями по способам оплаты медицинской помощи за счет средств обязательного медицинского страхования", утв. Минздравом России N 31-2/И/2-1075,
- < 1 мес. жизни ... 46 ... < 46 ... Допамин гидрохлорид 5 или добутамин гидрохлорид (любой из препаратов) ... Допамин гидрохлорид > 5 или **эпинефрин** 0.1 или норэпинефрин битартрат 0.1 ... Допамин гидрохлорид > 15 или **эпинефрин** > 0.1 или норэпинефрин битартрат > 0.1
- 43 Приказ Минздрава России от 28.10.2020 N 1165н (ред. от 13.04.2023)  
"Об утверждении требований к комплектации лекарственными препаратами и медицинскими изделиями упаковок и наборов для оказания скорой медицинской помощи"  
(Зарегистрировано в Минюсте России 26.11.2020 N 61099)
- 1.11.8 ... C01CA24 ... **эпинефрин** ... **эпинефрин** ... раствор для инъекций
- 44 "Клинические рекомендации "Нарушение обмена фосфора (Гипофосфатазия)"  
(утв. Минздравом России)
- Введение **эпинефрина**\*\*
- 45 "Клинические рекомендации "Менингококковая инфекция у детей"  
(утв. Минздравом России)
- 3 ... < 200 ... < 50 ... 102 - 204 ... Допамин\*\* > 5 мкг/кг/мин или **эпинефрин**\*\* < 0.1 с мкг/мин ... 6 - 9 б ... 300 - 440 и/или диурез за сутки < 500 мл
- 46 Приказ Минздрава России от 04.10.2022 N 646н  
"Об утверждении стандарта медицинской помощи взрослым при ожогах термических и химических, ожогах солнечных, ожогах дыхательных путей (диагностика и лечение)"  
(Зарегистрировано в Минюсте России 09.11.2022 N 70871)
- ... **Эпинефрин** ... 0,0032 ... мг ... 4 ... 24

- 47 Приказ Минздрава России от 09.08.2022 N 542н  
"Об утверждении стандарта медицинской помощи взрослым при нарушениях митохондриального бета-окисления жирных кислот (диагностика, лечение и диспансерное наблюдение)"  
(Зарегистрировано в Минюсте России 05.09.2022 N 69934)  
| ... **Эпинефрин** ... 0,12 ... мкг ... 700 ... 1 400
- 48 Приказ Минздрава России от 10.06.2021 N 612н (ред. от 27.05.2022)  
"Об утверждении стандарта медицинской помощи взрослым при остром инфаркте миокарда с подъемом сегмента ST электрокардиограммы (диагностика, лечение и диспансерное наблюдение)"  
(Зарегистрировано в Минюсте России 08.07.2021 N 64164)  
| ... **Эпинефрин** ... 0,025 ... мкг ... 500 ... 1 000
- 49 Приказ Минздрава России от 20.04.2022 N 272н  
"Об утверждении стандарта медицинской помощи взрослым при хронической сердечной недостаточности (диагностика, лечение и диспансерное наблюдение)"  
(Зарегистрировано в Минюсте России 02.06.2022 N 68714)  
| ... **Эпинефрин** ... 0,0015 ... мг ... 2 ... 6
- 50 Приказ Минздрава России от 24.12.2012 N 1554н (ред. от 20.04.2022)  
"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при сердечной недостаточности"  
(Зарегистрировано в Минюсте России 20.03.2013 N 27789)  
| ... **Эпинефрин** ... мг ... 0,5 ... 15