

Поиск по "Гепарин натрия"

- 1 ["ФС.3.3.0005.22. Фармакопейная статья. Бензилникотинат + Бензокаин + Гепарин натрия, мазь для наружного применения"](#)
(утв. и введена в действие Приказом Минздрава России от 11.04.2022 N 246) ("Государственная фармакопея Российской Федерации. XIV издание")
- 2 ["Методические рекомендации. Периоперационное ведение взрослых пациентов, получающих длительную анти тромботическую терапию"](#)
(утв. Президиумом Общероссийской общественной организации "Федерация анестезиологов и реаниматологов" 26.05.2021, Общим собранием Национальной Ассоциации специалистов по
| Нейроаксиальная анестезия и введение **гепарина натрия** (НФГ)
- 3 ["ОСТ 91500.11.0007-2003. Отраслевой стандарт. Протокол ведения больных. Профилактика тромбоэмболии легочной артерии при хирургических и иных инвазивных вмешательствах"](#)
(утв. Приказом Минздрава России от 09.06.2003 N 233)
| **Гепарин натрий** (heparin natrium)
- 4 ["Временные методические рекомендации "Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции \(COVID-19\). Версия 17 \(09.12.2022\)"](#)
(утв. Минздравом России) (вместе с "Рекомендациями по описанию данных РГ И КТ ОГК",
"Инструкцией по проведению диагностики COVID-19 с применением методов амплификации
| Профилактика ТГВ нижних конечностей/ТЭЛА с использованием профилактических доз низкомолекулярного **гепарина** (НМГ) или фондапаринукса **натрия** может рассматриваться у отдельных пациентов со среднетяжелой формой COVID-19, которые лечатся дома, имеют высокий
- 5 Приказ Росрыболовства от 04.08.2009 N 695 (ред. от 22.12.2016)
["Об утверждении Методических указаний по разработке нормативов качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нормативов предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значения"](#)
(Зарегистрировано в Минюсте России 03.09.2009 N 14702)
| В качестве антикоагулянта применяют **гепарин** или лимоннокислый **натрий** в виде порошка или 3,8% раствора, которым ополаскивают пробирки, или добавляют 1/4 часть раствора к объему крови.

6 ["Методические рекомендации "Особенности клинических проявлений и лечения заболевания, вызванного новой коронавирусной инфекцией \(COVID-19\) у детей. Версия 2 \(03.07.2020\)"](#)
(утв. Минздравом России)

НМГ предпочтительнее для терапии и профилактики тромбозов, т.к. биодоступность около 98%, большой период полувыведения (введение 1 - 2 раза в сутки), реже развивается **гепарин-**индуцированная тромбоцитопения. Предпочтение отдается далтепарину **натрия** (Фрагмин).

7 Обзор:
["Минздрав уточнил временные рекомендации по профилактике, диагностике и лечению COVID-19"](#)
(КонсультантПлюс, 2021)

- надропарин кальция, парнапарин **натрия** и фондапаринукс **натрия** на доступные лекарства **гепарина** для парентерального введения;

8 ["Государственный реестр лекарственных средств"](#)
(по состоянию на 08.09.2023) (Часть 2)

Гепарин натрия

9 ["Государственный реестр лекарственных средств"](#)
(по состоянию на 08.09.2023) (Часть 1)

70/367/18 ... 04.06.1970 ... Биосинтез ОАО ... Россия ... **Гепарин** ... **Гепарин натрия** ... субстанция- порошок аморфный, ~, шт. - банки темного стекла /~/; ... Нет ... Нет

10 Постановление Правительства РФ от 03.04.2020 N 430 (ред. от 28.12.2021)

["Об особенностях обращения медицинских изделий, в том числе государственной регистрации серии \(партии\) медицинского изделия"](#)

303. ... 293420 ... Пробирка вакуумная для взятия образцов крови ИВД, с **натрия гепарином** <*>

11 Приказ Росавиакосмоса от 15.08.2003 N 165

["Об утверждении Федеральных авиационных правил "Организация работы медицинского персонала авиационных организаций экспериментальной авиации"](#)

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 22.09.2003 N 5101)

в) медикаменты и перевязочный материал (из расчета 100 обращений в месяц)

12 Приказ Росгидромета от 09.01.2014 N 1

["Об утверждении норм обеспечения бесплатным питанием, вещевым довольствием и лекарственными средствами лиц, входящих в состав Российской антарктической экспедиции"](#)

(Зарегистрировано в Минюсте России 28.02.2014 N 31460)

B01AB ... **Гепарин натрия** ... раствор для инъекций 5 тыс. МЕ/мл 5 мл N 5 ... флакон ... 1 ... 75 ... 10
... 8

- 13 ["Клинические рекомендации "Венозные осложнения во время беременности и послеродовом периоде. Акушерская тромбоэмболия"](#)
(утв. Минздравом России)
| Приложение А3.2. Режим антикоагулянтной терапии **гепарином натрия** и оральными антитромботическими средствами
- 14 [Распоряжение Правительства РФ от 12.10.2019 N 2406-р \(ред. от 09.06.2023\)](#)
["Об утверждении перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, а также перечней лекарственных препаратов для медицинского применения и минимального ассортимента лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи"](#)
| В01AB ... группа **гепарина** ... **гепарин натрия** ... раствор для внутривенного и подкожного введения; ... раствор для инъекций
- 15 ["Клинические рекомендации "Единый желудочек сердца"](#)
(утв. Минздравом России)
| Протокол тромбопрофилактики **гепарином натрия**
- 16 ["Клинические рекомендации "Хроническая болезнь почек \(ХБП\)"](#)
(утв. Минздравом России)
| 1. Схемы дозирования **гепарина натрия**** в ходе процедуры гемодиализа
- 17 ["Клинические рекомендации "Фибрилляция и трепетание предсердий у взрослых"](#)
(утв. Минздравом России)
| Таблица П5. Лечебные дозы **гепарина натрия****, эноксапарина **натрия**** и надропарина кальция, используемые у больных фибрилляцией предсердий
- 18 Информационное письмо Минфина России от 13.07.2023 N 24-03-08/65656
["О предоставлении преимуществ организациям инвалидов при осуществлении закупок с использованием позиций каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"](#)
(вместе с "Информацией о соотношении позиций перечня товаров, работ, услуг, при осуществлении закупок которых предоставляются преимущества участнику закупки, являющемуся организацией)
| 32.50.50.190-00001522 ... Капиллярная трубка для сбора капиллярной крови ИВД, с **натрий гепарином** ... 32.50.50.190

- 19 ["Временные методические рекомендации "Медицинская реабилитация при новой коронавирусной инфекции \(COVID-19\). Версия 3 \(01.11.2022\)"](#)
(утв. Минздравом России) (вместе с "Правилами определения этапов медицинской реабилитации пациентов, перенесших новую коронавирусную инфекцию, вызванную COVID-19", "Непрерывной и
- | ...CaCl₂ с анода), 2 - 4% р-ра новокаина с анода, лидазы (0,1 г лидазы в 30 мл ацетатного буферного р-ра с анода), йода (1 - 5% р-р йодистого калия или **натрия** с катода), **гепарина** на область воспалительного инфильтрата...
- 20 ["МУ 2.6.5.053-2017. 2.6.5. Атомная энергетика и промышленность. Организация аварийного радиационного контроля внешнего облучения персонала при проведении работ на ядерно-опасных участках предприятий госкорпорации "Росатом". Общие требования. Методические указания"](#)
(утв. ФМБА России 11.10.2017)
- | ...и добавить **гепарин** для предотвращения свертывания крови. Несколько раз встряхнуть контейнер.Примечание: При необходимости добавить растворитель для повторного растворения пробы крови. Его количество необходимо точно отмерить, поскольку растворители, как правило,
- 21 [Распоряжение Правительства РФ от 06.07.2010 N 1141-р \(ред. от 01.08.2020\)](#)
[<Об утверждении перечня стратегически значимых лекарственных средств>](#)
- | 37. ... **Гепарин натрия**
- 22 [Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 11.08.2020 N 100 \(ред. от 25.10.2022\)](#)
["О Фармакопее Евразийского экономического союза"](#)
- | **Гепарин**. [9041-08-1]. **Гепарин натрия**.
- 23 ["Клинические рекомендации "Трансплантация сердца, наличие трансплантированного сердца, отмирание и отторжение трансплантата сердца"](#)
(утв. Минздравом России)
- | ...пациентов с сердечной недостаточностью, ожидающих трансплантацию сердца, являются кахексия, связанная с сердечной недостаточностью, сниженная подвижность/физическая активность, низкие уровни 25-гидроксивитамина D в плазме крови, гипогонадизм, длительное
- 24 ["Клинические рекомендации "Трансплантация поджелудочной железы, наличие трансплантированной поджелудочной железы, отмирание и отторжение трансплантата поджелудочной железы"](#)
(утв. Минздравом России)
- | - Рекомендуется поводить профилактику венозного тромбоза поджелудочной железы постоянной внутривенной инфузией **гепарина натрия**** с помощью насоса инфузионного шприцевого в течение 2 - 4 дней после трансплантации.

25 "Клинические рекомендации "Геморрагический инсульт"

(утв. Минздравом России)

- Рекомендуется для ингибирования эффекта **гепарина натрия**** у пациентов с острым геморрагическим инсультом на индивидуальной основе с учетом имеющихся показаний и противопоказаний назначение протамина сульфата** [142].

26 "Клинические рекомендации "Врожденный клапанный стеноз аорты"

(утв. Минздравом России)

При необходимости выполнения различных плановых хирургических вмешательств (абдоминальных, полостных) необходима отмена антитромботических средств (антагониста витамина К) и перевод пациента на антикоагулянтную терапию препаратами группы **гепарина**

27 "Клинические рекомендации "Врожденный подклапанный стеноз аорты"

(утв. Минздравом России)

При необходимости выполнения различных плановых хирургических вмешательств (абдоминальных, полостных) необходима отмена непрямых антикоагулянтов (антагониста витамина К) и перевод пациента на антикоагулянтную терапию препаратами группы **гепарина**

28 "Клинические рекомендации "Аниридия врожденная"

(утв. Минздравом России)

Для проведения кариотипирования и in situ гибридизации (FISH) из крови, собранной в пробирку с **гепарином натрия****, готовится суспензия ядер.

29 "Клинические рекомендации "Острые отравления опиоидными наркотическими веществами"

(утв. Минздравом России)

Начальная доза **гепарина натрия**** вводимого в лечебных целях обычно составляет 5000 МЕ и вводится внутривенно, после чего лечение продолжают, используя подкожные инъекции или внутривенные инфузии.

30 "Клинические рекомендации "Нарушение обмена серосодержащих аминокислот (гомоцистинурия)"

(утв. Минздравом России)

При классической гомотистинурии обычно назначаются препараты группы **гепарина** (низкомолекулярные **гепарины**) или **гепарин натрия**** (5000 Ед x 2р/дн [92]) или препарат группы салициловая кислота и ее производные в низких дозах.

31 "Клинические рекомендации "Гемолитико-уремический синдром"

(утв. Минздравом России)

Плазмообмен проводится под непрерывным введением препаратов из группы **гепарина** (нефракционированные) (НФГ), например, **гепарин натрия****: болюс 100 Ед/кг, поддерживающая доза - 20 Ед/кг в час. Замещение - 5% альбумин человека** + **натрия** хлорид (0,9%)** + СЗП.

- 32 "Клинические рекомендации "Инфекционный эндокардит и инфекция внутрисердечных устройств"
(утв. Минздравом России)
- У пациентов с ИЭ, которые получают варфарин**, при ишемическом инсульте без кровоизлияния рекомендовано рассмотреть замену антикоагулянтов непрямого действия (антагонисты витамина К) на **гепарин натрия**** или НМГ (например, надропарин кальция/эноксапарин **натрия****/далтепарин
- 33 "Клинические рекомендации "Болезнь Паркинсона, вторичный паркинсонизм и другие заболевания, проявляющиеся синдромом паркинсонизма"
(утв. Минздравом России)
- Одновременно необходима профилактика тромбоза глубоких вен голени (малые дозы **гепарина натрия****, бинтование нижних конечностей) и пролежней (регулярные повороты в постели), тщательный уход за кожей.
- 34 "Клинические рекомендации "Химический ожог пищевода"
(утв. Минздравом России)
- Пациентам с ХОП с целью лечения ранних вторичных кровотечений рекомендуется проведение мероприятий по усилению гемостаза в месте кровотечения, а также угнетению внутрисосудистой коагуляции с целью профилактики микротромбообразования, при этом введение **гепарина**
- 35 "Клинические рекомендации "Апластическая анемия"
(утв. Минздравом России)
- **Гепарин натрия****- Декстроза + **натрия** цитрат
- 36 "Клинические рекомендации "Ожоги термические и химические. Ожоги солнечные. Ожоги дыхательных путей"
(утв. Минздравом России)
- ...Возможно в течение 7 суток после ингаляционной травмы ингаляционное введение через небулайзер муколитических препаратов и **#гепарина натрия**** (раствор **#ацетилцистеин**** 20% - 3 мл каждые 4 часа чередующиеся с введением 5000 единиц (у детей) или 10000 единиц (у
- 37 "Клинические рекомендации "Синдром гиперстимуляции яичников"
(утв. Минздравом России)
- Пациенткам с высоким риском СГЯ после ТВП и при развитии СГЯ рекомендован **гепарин натрия****, или эноксапарин **натрия****, или надропарин кальция, или далтепарин **натрия** в профилактических дозах с целью профилактики ТЭО (63), (64), (65), (66), (40).
- 38 "Клинические рекомендации "Флебит и тромбофлебит поверхностных сосудов"
(утв. Минздравом России)
- Для лечения постинъекционного ТФПВ в стадию острого и стихающего тромбофлебита с целью более быстрого купирования симптомов рекомендуется использовать системные и/или местные формы НПВП и/или местные **гепарин натрия****-содержащие средства.

- 39 "Клинические рекомендации "Ишемический инсульт и транзиторная ишемическая атака у взрослых"
(утв. Минздравом России)
- Рекомендуется профилактическая антикоагуляция **гепарином натрия** (5000 единиц п/к 2 или 3 раза в день) или надропарином кальция для неподвижных пациентов с ишемическим инсультом, у которых преимущества снижения риска венозной тромбоэмболии достаточно высоки, чтобы
- 40 "Клинические рекомендации "Переломы бедренной кости (кроме проксимального отдела бедренной кости)"
(утв. Минздравом России)
- Следует учесть, что проведение спинальной или эпидуральной анестезии возможно только спустя 12 часов после введения дозы **гепаринов** низкомолекулярных (АТХ Группа **гепаринов**) и не раньше, чем через 4 - 6 часов после введения **гепарина натрия** (при этом показатели АЧТВ или
- 41 "Клинические рекомендации "Пароксизмальная ночная гемоглобинурия"
(утв. Минздравом России)
- **Гепарин натрия****- Декстроза + **натрия** цитрат
- 42 "Клинические рекомендации "Старческая астения"
(утв. Минздравом России)
- Рекомендуется назначение **гепарина натрия**** как препарата выбора среди парентеральных антикоагулянтов у пожилых пациентов со старческой астенией и с тяжелым нарушением функции почек (КК < 15 мл/мин) [137, 151, 152].
- 43 "Клинические рекомендации "Миокардиты"
(утв. Минздравом России)
- ...у пациентов, находящихся на постельном режиме, риск развития тромбозов и эмболий достоверно снижается на фоне терапии низкомолекулярным **гепарином** - Эноксапарином **натрия**** (Группа **гепарина** B01AB, син. антикоагулянты прямые (**гепарин** и его производные)) в
- 44 "Клинические рекомендации "Острый инфаркт миокарда с подъемом сегмента ST электрокардиограммы"
(утв. Минздравом России)
- НФГ - нефракционированный **гепарин** (**гепарин натрия****)
- 45 "Клинические рекомендации "Гипертрофическая кардиомиопатия"
(утв. Минздравом России)
- Беременным с ГКМП и ФП рекомендована антикоагулянтная терапия (выбор препарата - **гепарин натрия** (нефракционированный или низкомолекулярный) или варфарин** - зависит от срока беременности).

46 "Клинические рекомендации "Острый коронарный синдром без подъема сегмента ST электрокардиограммы"

(утв. Минздравом России)

НФГ - нефракционированный **гепарин (гепарин натрия**)**

47 "Клинические рекомендации "Острый промиелоцитарный лейкоз"

(утв. Минздравом России)

Преимущество от использования **гепарина натрия****, транексамовой кислоты**, аминокaproновой кислоты**, других антикоагулянтов или ингибиторов фибринолиза спорно и не доказано, и эти препараты не должны использоваться вне клинических испытаний.

48 "Клинические рекомендации "Язвенный колит"

(утв. Минздравом России)

Комментарий: С этой целью используют группу **гепарина** (низкомолекулярные **гепарины**), например, #эноксапарин **натрия**** в дозе 1 мг/кг подкожно 1 раз в день [114, 115].

49 "Клинические рекомендации "Первичные опухоли центральной нервной системы"

(утв. Минздравом России)

- В периоперационном периоде для предупреждения тромбоэмболии легочной артерии начиная с 3-х суток после операции пациентам с опухолями головного мозга рекомендовано назначение низкомолекулярных **гепаринов** (надропарин кальция, эноксапарин **натрия****, далтепарин **натрия** и

50 "МУ 4.2.2039-05. 4.2. Методы контроля. Биологические и микробиологические факторы. Техника сбора и транспортирования биоматериалов в микробиологические лаборатории. Методические указания"

(утв. Роспотребнадзором 23.12.2005)

Кровь собирают в стерильные одноразовые или стеклянные пробирки с антикоагулянтом (**гепарин**, ЭДТА, цитрат **натрия**).