

## Поиск по "Клопидогрел"

- 1 ["ФС.3.1.0155.22. Фармакопейная статья. Клопидогрела сульфат, капсулы. Клопидогрел, капсулы"](#) (утв. и введена в действие Приказом Минздрава России от 11.04.2022 N 246) ("Государственная фармакопея Российской Федерации. XIV издание")
- 2 ["МУК 4.1.3333-16. 4.1. Методы контроля. Химические факторы. Методика измерений массовой концентрации метил-\(+\)-\(S\)-альфа-\(o-хлорфенил\)-6,7-дигидротиено\[3,2-с\]пиридин-5\(4H\)-ацетата гидросульфата \(клопидогрела гидросульфат\) в воздухе рабочей зоны методом спектрофотометрии.](#) (утв. Роспотребнадзором 17.02.2016)
- 3 Постановление Правительства РФ от 14.02.2002 N 103 (ред. от 01.02.2005)  
["Об утверждении перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств и изделий медицинского назначения для бесплатного приобретения гражданами, постоянно проживающими \(работающими\) на территории зоны проживания с правом на отселение, в соответствии с пунктом](#)  
| 190. **Клопидогрел** (таблетки)
- 4 ["Временные методические рекомендации "Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции \(COVID-19\). Версия 17 \(09.12.2022\)"](#)  
(утв. Минздравом России) (вместе с "Рекомендациями по описанию данных РГ И КТ ОГК",  
"Инструкцией по проведению диагностики COVID-19 с применением методов амплификации  
| Нет доказательств целесообразности широкого применения антиагрегантов для лечения COVID-19. Когда требуется лечение в ОРИТ, данные одного рандомизированного контролируемого исследования указывают на возможную пользу от добавления антиагреганта (ацетилсалициловой
- 5 ["Методические рекомендации "Особенности клинических проявлений и лечения заболевания, вызванного новой коронавирусной инфекцией \(COVID-19\) у детей. Версия 2 \(03.07.2020\)"](#)  
(утв. Минздравом России)  
| Высокие дозы ацетилсалициловой кислоты (80 мг/кг/с) допустимы при развитии мультисистемного воспалительного синдрома. Препаратом выбора может служить **клопидогрел** (1 - 3 мг/кг/сутки).
- 6 ["Государственный реестр лекарственных средств"](#)  
(по состоянию на 08.09.2023) (Часть 2)  
| **Клопидогрел-АКОС****Клопидогрел**

7 [Постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 18.01.2023 N 11АП-18511/2022 по делу N А72-280/2022](#)

**Требование:** О признании незаконными, не подлежащими исполнению решений органа ФОМС по актам повторной экспертизы качества медицинской помощи, актов экспертиз и реэкспертиз качества медицинской помощи, взыскании неправомерно удержанных денежных сумм за оказание медицинской помощи и штрафов.

**Решение:** Требование удовлетворено.

По больному с Полисом ОМС N 159...006 эксперт Разин В.А. сделал вывод, что предварительный диагноз нестабильная стенокардия, и, как следствие, модель пациента ОКС не обоснован клинически при поступлении, не описано время болевого синдрома, купируемость нитратами, указание в заключительном клиническом диагнозе о клинической стабилизации в стенокардию напряжения 2ф кл. не подтверждается документально. Сбор жалоб и анамнез краткий и

8 ["Государственный реестр лекарственных средств"](#)

(по состоянию на 08.09.2023) (Часть 1)

Ацетилсалициловая кислота+**Клопидогрел**

9 Справочная информация:

["Санитарно-эпидемиологическое нормирование"](#)

(Материал подготовлен специалистами КонсультантПлюс)

Методические указания МУК 4.1.3333-16 Методика измерений массовой концентрации метил-(+)-(S)-альфа-(о-хлорфенил)-6,7-дигидротиено[3,2-с]пиридин-5(4H)-ацетата гидросульфата (**клопидогрела** гидросульфат) в воздухе рабочей зоны методом спектрофотометрии" ...

10 Приказ Росгидромета от 09.01.2014 N 1

["Об утверждении норм обеспечения бесплатным питанием, вещевым довольствием и лекарственными средствами лиц, входящих в состав Российской антарктической экспедиции"](#)  
(Зарегистрировано в Минюсте России 28.02.2014 N 31460)

В01АС ... **Клопидогрел** ... таблетки 75 мг N 14 ... упаковка ... 1 ... 15 ... 2 ... 2

11 Распоряжение Правительства РФ от 12.10.2019 N 2406-р (ред. от 09.06.2023)

[<Об утверждении перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, а также перечней лекарственных препаратов для медицинского применения и минимального ассортимента лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи>](#)

В01АС ... антиагреганты, кроме гепарина ... **клопидогрел** ... таблетки, покрытые пленочной оболочкой

12 Распоряжение Правительства РФ от 06.07.2010 N 1141-р (ред. от 01.08.2020)

[<Об утверждении перечня стратегически значимых лекарственных средств>](#)

97.... **Клопидогрел**

13 "Клинические рекомендации "Дефект межпредсердной перегородки"

(утв. Минздравом России)

...кислота\*\* (off-label у детей до 18 лет) в дозе 5 мг/кг/сутки в один прием (не более 325 мг/сутки) или **#клопидогрел\*\*** (off-label у детей до 18 лет) в дозе 0,2 - 1,0 мг/кг/сутки в один прием [7, 26].

14 "Клинические рекомендации "Трансплантация поджелудочной железы, наличие трансплантированной поджелудочной железы, отмирание и отторжение трансплантата поджелудочной железы"

(утв. Минздравом России)

Комментарии: ретроспективное одноцентровое исследование "случай-контроль" у пациентов, перенесших трансплантацию почки, пришло к выводу, что продолжение антиагрегантной терапии ацетилсалициловой кислотой\*\* или **клопидогрелом\*\*** не создает значительно более высокого

15 "Клинические рекомендации "Геморрагический инсульт"

(утв. Минздравом России)

- Рекомендуется возобновление приема ацетилсалициловой кислоты\*\*, дипиридамола, **клопидогрела\*\*** в монотерапии или комбинации ацетилсалициловой кислоты\*\* с дипиридамолом или **клопидогрелом\*\*** у пациентов, перенесших геморрагический инсульт, которые до

16 "Клинические рекомендации "Врожденный клапанный стеноз аорты"

(утв. Минздравом России)

...в последующем используются #ацетилсалициловая кислота\*\* (off-label у детей до 15 лет) в дозе 3 - 5 мг/кг/сутки (не более 325 мг/сутки) или **#клопидогрел\*\*** (off-label у детей до 18 лет) в дозе 0,2 - 1,0 мг/кг/сутки [78, 79, 88, 90]

17 "Клинические рекомендации "Врожденный подклапанный стеноз аорты"

(утв. Минздравом России)

...в последующем используются #ацетилсалициловая кислота\*\* (off-label у детей до 15 лет) в дозе 3 - 5 мг/кг/сутки (не более 325 мг/сутки) или **#клопидогрел\*\*** (off-label у детей до 18 лет) в дозе 0,2 - 1,0 мг/кг/сутки [49, 50, 52, 54]

18 "Клинические рекомендации "Сахарный диабет 2 типа у взрослых"

(утв. Минздравом России)

...врача - сердечно-сосудистого хирурга с контролем ультразвукового дуплексного сканирования артерий нижних конечностей 1 раз в 3 месяца, постоянное применение двухкомпонентной дезагрегантной терапии (**клопидогрел\*\*** + ацетилсалициловая кислота\*\*) в течение не менее 6

19 "Клинические рекомендации "Сахарный диабет 1 типа у взрослых"

(утв. Минздравом России)

Комментарии: Терапия ацетилсалициловой кислотой\*\* не показана пациентам с СД 1 без сердечно-сосудистых заболеваний. При непереносимости ацетилсалициловой кислоты\*\* рекомендуется прием **клопидогрела\*\***.

20 "Клинические рекомендации "Общий артериальный ствол"

(утв. Минздравом России)

...качестве антитромботических средств используются #ацетилсалициловая кислота\*\* (off-label у детей до 15 лет) перорально в дозе 1 - 5 мг/кг/сутки в один прием или #**клопидогрел\*\*** (off-label у детей до 18 лет) перорально в дозе 0,2 мг/кг/сутки в один прием [220].

21 "Клинические рекомендации "Дефект аортолегочной перегородки"

(утв. Минздравом России)

...мг/сутки) в течение 6 мес., при размерах имплантированного устройства более 30 мм применяется к #ацетилсалициловой кислоте\*\* в той же дозе дополнительно #**клопидогрел\*\*** из расчета (off-label у детей до 18 лет) 1,5 - 2,0 мг/кг/сутки в один прием в течение 3...

22 "Клинические рекомендации "Гемолитико-уремический синдром"

(утв. Минздравом России)

- лекарствами (циклоsporин\*\*, такролимус\*\*, сиролимус, эверолимус\*\*, гемцитабин\*\*, митомицин\*\*, бевацизумаб\*\*, сунитиниб\*\*, бортезомиб\*\*, карфилзомиб\*\*, адалимумаб\*\*, **клопидогрел\*\***, симвастатин\*\*, эстрогены, прогестагены, прогестагены и эстрогены в комбинации и др.)

23 "Клинические рекомендации "Болезнь Паркинсона, вторичный паркинсонизм и другие заболевания, проявляющиеся синдромом паркинсонизма"

(утв. Минздравом России)

...эпизод иной локализации, с целью профилактики повторных ишемических эпизодов показано длительное применение антиагрегантов, кроме гепарина (ацетилсалициловой кислоты\*\* 50 - 100 мг/сут, или **клопидогрела\*\*** 75 мг/сут). Назначение антиагрегантов, кроме гепарина возможно

24 "Клинические рекомендации "Ишемический инсульт и транзиторная ишемическая атака у взрослых"

(утв. Минздравом России)

Комментарий: В нерандомизированном сравнительном исследовании отмечено, что применение двойной антиагрегантной терапии не повышало вероятность симптомного внутричерепного кровоизлияния, при этом **клопидогрел\*\*** был более безопасен, чем тикагрелор\*\* [271].

25 "Клинические рекомендации "Хроническая болезнь почек (ХБП)"

(утв. Минздравом России)

- Всем пациентам с ХБП после формирования АВФ при отсутствии противопоказаний мы рекомендуем назначение **#клопидогрела\*\*** (75 мг/сут, внутрь, не менее 6 недель) с целью снижения риска тромбоза доступа [463].

26 "Клинические рекомендации "Фибрилляция и трепетание предсердий у взрослых"

(утв. Минздравом России)

К более низким значениям МНО в пределах целевого диапазона (2,0 - 2,5) следует стремиться при приеме варфарина\*\* в комбинации с ацетилсалициловой кислотой\*\*\* или **клопидогрелом\*\***) или при возобновлении терапии после кровотечения.

27 "Клинические рекомендации "Старческая астения"

(утв. Минздравом России)

...доз ацетилсалициловой кислоты\*\* (АСК) при отсутствии индивидуальной непереносимости, активного кровотечения или предшествующего внутричерепного кровоизлияния у пациентов с синдромом старческой астении для вторичной профилактики ССЗ. При непереносимости АСК\*\*

28 "Клинические рекомендации "Хроническая боль у пациентов пожилого и старческого возраста"

(утв. Минздравом России)

Показано, что омепразол\*\* и, частично, лансопразол замедляют метаболизм карбамазепина\*\*, циклоспорина\*\*, диазепамы\*\*, дигоксина\*\*, нифедипина\*\*, фенитоина\*\*, теофиллина, варфарина\*\*, **клопидогрела\*\***.

29 "Клинические рекомендации "Острый инфаркт миокарда с подъемом сегмента ST электрокардиограммы"

(утв. Минздравом России)

...выждав 3 - 7 дней после отмены блокатора P2Y12-рецепторов тромбоцитов (АТХ-группа - антиагреганты, кроме гепарина) (тикагрелор\*\* следует отменить как минимум за 3 - 5 дней, **клопидогрел\*\*** - как минимум за 5 дней, прасугрел - как минимум за 7 дней до планового

30 "Клинические рекомендации "Гипертрофическая кардиомиопатия"

(утв. Минздравом России)

- Терапия ацетилсалициловой кислотой в дозировке 75 - 100 мг плюс **клопидогрел\*\*** 75 мг в день (при низком риске кровотечений) рекомендуется, если пациент с ГКМП, осложненной ФП, отказывается принимать варфарин\*\* или дабигатрана этексилат\*\* или ривароксабан\*\*, или

- 31 ["Клинические рекомендации "Стабильная ишемическая болезнь сердца"](#)  
(утв. Минздравом России)
- При непереносимости АСК\*\* для профилактики ССО в качестве альтернативного ингибитора агрегации тромбоцитов пациентам со стабильной ИБС рекомендуется назначить **клопидогрел\*\*** в дозе 75 мг в сутки [88]. ЕОК I B (УУР А, УДД 2)
- 32 ["Клинические рекомендации "Острый коронарный синдром без подъема сегмента ST электрокардиограммы"](#)  
(утв. Минздравом России)
- Введение морфина\*\* приводит к замедлению начала действия антиагрегантов (**клопидогрел\*\***, тикагрелор\*\*, прасугрел).
- 33 ["Клинические рекомендации "Первичные опухоли центральной нервной системы"](#)  
(утв. Минздравом России)
- При постоянном использовании пациентами антикоагулянтов/антиагрегантов (варфарин\*\*, **клопидогрел\*\***, ацетилсалициловая кислота\*\*, фениндион, аценокумарол и т.п.) рекомендовано переводение на низкомолекулярные гепарины (например, под контролем тромбоэластограммы)
- 34 ["Клинические рекомендации "Сахарный диабет 2 типа у взрослых"](#)  
(утв. Минздравом России)
- Комментарии: Терапия ацетилсалициловой кислотой\*\* не показана пациентам с СД без сердечно-сосудистых заболеваний. При неэффективности ацетилсалициловой кислоты\*\* необходимо назначение **клопидогрела\*\*** [403].
- 35 ["Клинические рекомендации "Сахарный диабет 1 типа у взрослых"](#)  
(утв. Минздравом России)
- Комментарии: Терапия ацетилсалициловой кислотой\*\* не показана пациентам с СД без сердечно-сосудистых заболеваний. При непереносимости ацетилсалициловой кислоты\*\* рекомендуется прием **клопидогрела\*\***.
- 36 Приказ Минздрава России от 11.09.2023 N 469н  
["Об утверждении перечня лекарственных препаратов в целях обеспечения пациентов, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием \(Зарегистрировано в Минюсте России 13.09.2023 N 75200\)](#)
17. ... **Клопидогрел** ... таблетки, покрытые пленочной оболочкой ... 75 мг

- 37 Приказ Минздрава России от 28.10.2020 N 1165н (ред. от 13.04.2023)  
"Об утверждении требований к комплектации лекарственными препаратами и медицинскими изделиями упаковок и наборов для оказания скорой медицинской помощи"  
(Зарегистрировано в Минюсте России 26.11.2020 N 61099)  
| 1.8.3 ... B01AC04 ... **клопидогрел** ... **клопидогрел** ... таблетки, покрытые пленочной оболочкой
- 38 Приказ Минздрава России от 01.02.2023 N 36н  
"Об утверждении перечня лекарственных препаратов и фармакотерапевтических групп лекарственных препаратов, разрешенных к реализации в рамках эксперимента по осуществлению розничной торговли лекарственными препаратами для медицинского применения, отпускаемыми (Зарегистрировано в Минюсте России 21.02.2023 N 72431)  
| Ацетилсалициловая кислота + **Клопидогрел** ... B01AC30 ... ингибиторы агрегации тромбоцитов в комбинации ... таблетки; ... таблетки, покрытые пленочной оболочкой; ... капсулы с модифицированным высвобождением
- 39 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 2 (ред. от 30.12.2022)  
"Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"  
(вместе с "СанПиН 1.2.3685-21. Санитарные правила и нормы...") (Зарегистрировано в Минюсте России 29.01.2021 N 62296)  
| 598. ... Метил-(+)-(8)-альфа-(о-хлорфенил)-6,7-дигидротиено [3,2-с]пиридин-5(4Н)-ацетат гидросульфат (**клопидогрела** гидросульфат) ... 120202-66-6 ... C16H16ClNO2S x H2SO4 ... 0,2 ... а
- 40 Приказ Минздрава России от 29.09.2022 N 639н  
"Об утверждении перечня лекарственных препаратов для медицинского применения в целях обеспечения в амбулаторных условиях лиц, находящихся под диспансерным наблюдением, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым (Зарегистрировано в Минюсте России 27.10.2022 N 70725)  
| 17. ... **Клопидогрел** ... таблетки, покрытые пленочной оболочкой ... 75 мг
- 41 Приказ Минздрава России от 10.06.2021 N 612н (ред. от 27.05.2022)  
"Об утверждении стандарта медицинской помощи взрослым при остром инфаркте миокарда с подъемом сегмента ST электрокардиограммы (диагностика, лечение и диспансерное наблюдение)"  
(Зарегистрировано в Минюсте России 08.07.2021 N 64164)  
| ... Ацетилсалициловая кислота + **Клопидогрел** ... 0,0036 ... мг ... 100 + 75 ... 36 400 + 27 300

- 42 Приказ Минздрава России от 28.04.2021 N 410н  
"Об утверждении стандарта медицинской помощи взрослым при стабильной ишемической болезни сердца (диагностика, лечение и диспансерное наблюдение)"  
(Зарегистрировано в Минюсте России 24.05.2021 N 63596)  
| ... **Клопидогрел** ... 0,083 ... мг ... 75 ... 27 375
- 43 Приказ Минздрава России от 02.03.2021 N 158н  
"Об утверждении стандарта медицинской помощи взрослым при остром коронарном синдроме без подъема сегмента ST электрокардиограммы (диагностика, лечение и диспансерное наблюдение)"  
(Зарегистрировано в Минюсте России 12.04.2021 N 63094)  
| ... Ацетилсалициловая кислота + **Клопидогрел** ... 0,009 ... мг ... 100 + 75 ... 36 400 + 27 300
- 44 "Клинические рекомендации "Переломы проксимального отдела бедренной кости"  
(утв. Минздравом России)  
| **Клопидогрел**\*\* ... За 7 дней ... Сразу после удаления катетера
- 45 "Клинические рекомендации "Серповидно-клеточные нарушения"  
(утв. Минздравом России)  
| **Клопидогрел**\*\* 75 мг/сут
- 46 Приказ Минздрава России от 30.10.2020 N 1183н  
"Об утверждении требований к комплектации лекарственными препаратами и медицинскими изделиями укладки для оказания первичной медико-санитарной помощи взрослым в неотложной форме"  
(Зарегистрировано в Минюсте России 24.11.2020 N 61082)  
| 1.7 ... В01АС ... антиагреганты, кроме гепарина ... **клопидогрел** ... таблетки, покрытые пленочной оболочкой
- 47 Приказ Минздрава России от 01.10.2020 N 1054н  
"Об утверждении стандартов медицинской помощи взрослым при сахарном диабете 2 типа"  
(вместе со "Стандартом медицинской помощи взрослым при сахарном диабете 2 типа", "Стандартом специализированной медицинской помощи взрослым при тяжелой гипогликемии при сахарном  
| ... **Клопидогрел** ... 0,5 ... мг ... 75 ... 27 375
- 48 Приказ Минздрава России от 01.10.2020 N 1053н  
"Об утверждении стандартов медицинской помощи взрослым при сахарном диабете 1 типа"  
(вместе со "Стандартом специализированной медицинской помощи взрослым при тяжелой гипогликемии при сахарном диабете 1 типа", "Стандартом медицинской помощи взрослым при  
| ... **Клопидогрел** ... 0,5 ... мг ... 75 ... 27 375



49 "Временные методические рекомендации "Ведение пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения в контексте пандемии COVID-19. Версия 2"

(утв. Минздравом России 16.04.2020)

Лопинавир/ритонавир ... Амиодарон ... Рифампицин ... Апиксабан ... Ривароксабан ... **Клопидогрел**  
... Тикагрелор ... Кветиапин ... Зипрасидон ... Мидазолам ... Домперидон ... Эплеренон ... Ивабрадин  
... Ранолазин ... Ловастатин ... Симвастатин ... Сиролимус ... Будесонид ... Флутиказон ...

50 "Основные разделы электронной медицинской карты"

(утв. Минздравом России 11.11.2013 N 18-1/1010)

7... Дата и время назначения **клопидогреля** ... Ввод даты с помощью Календаря ... Дата  
(ДД.ММ.ГГГГ ЧЧ.ММ) ... Выбор соответствующих числа, месяца и года из календаря