

Поиск по "Левобупивакаин"

- 1 ["Государственный реестр лекарственных средств"](#)
(по состоянию на 08.09.2023) (Часть 2)
| **Левобупивакаин**

- 2 ["Государственный реестр лекарственных средств"](#)
(по состоянию на 08.09.2023) (Часть 1)
| **ЛевобупивакаинЛевобупивакаин**

- 3 [Распоряжение Правительства РФ от 12.10.2019 N 2406-р \(ред. от 09.06.2023\)](#)
[<Об утверждении перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, а также перечней лекарственных препаратов для медицинского применения и минимального ассортимента лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи>](#)
| **... левобупивакаин ...** раствор для инъекций

- 4 ["Клинические рекомендации "Оперативные влагалищные роды \(Роды одноплодные, родоразрешение с наложением щипцов или с применением вакуум-экстрактора\)"](#)
(утв. Минздравом России)
| Недостаточно доказательств, подтверждающих, что какой-либо конкретный анальгетик или метод являются наиболее эффективными для обезболивания роженицы при влагалищных родоразрешающих операциях [26]. При наличии нейроаксиальной аналгезии ее

- 5 ["Клинические рекомендации "Истмико-цервикальная недостаточность"](#)
(утв. Минздравом России)
| ...спинальные иглы малого диаметра 25 - 27G. Рекомендуемая дозировка местных анестетиков составляет для бупивакаина** 5 - 10 мг (изобарический или гипербарический раствор), для **левобупивакаина**** 5 - 7,5 мг, для лидокаина** 20 - 40 мг. Применение эпидуральной и спинально-

- 6 ["Клинические рекомендации "Выкидыш \(самопроизвольный аборт\)"](#)
(утв. Минздравом России)
| При проведении спинальной анестезии применяются спинальные иглы малого диаметра 25 - 27G. Рекомендуемая дозировка местных анестетиков составляет для бупивакаина** 5 - 10 мг (изобарический или гипербарический раствор), для **левобупивакаина**** 5 - 7,5, для лидокаина** 20

7 "Клинические рекомендации "Роды одноплодные, самопроизвольное родоразрешение в затылочном предлежании (нормальные роды)"

(утв. Минздравом России)

При проведении нейроаксиальной анальгезии в акушерстве применяют современные местные анестетики (ропивакаин**, бупивакаин**, лидокаин**, **левобупивакаин****). Кроме эпидуральной, спинальной и спинально-эпидуральной возможно применение паравerteбральной поясничной

8 Рекомендация Коллегии Евразийской экономической комиссии от 29.12.2015 N 30

"О Правилах отнесения лекарственных препаратов с учетом действующих веществ, входящих в их состав, к категориям лекарственных препаратов, отпускаемых без рецепта и по рецепту"

Левобупивакаин ... N01BB10 ... I