

Поиск по "Метоклопрамид"

- 1 ["Государственный реестр лекарственных средств"](#)
(по состоянию на 08.09.2023) (Часть 2)
| **Метоклопрамид-Виал****Метоклопрамид**
- 2 ["Государственный реестр лекарственных средств"](#)
(по состоянию на 08.09.2023) (Часть 1)
| **Метоклопрамид-Виал****Метоклопрамид**
- 3 Приказ Росгидромета от 09.01.2014 N 1
["Об утверждении норм обеспечения бесплатным питанием, вещевым довольствием и лекарственными средствами лиц, входящих в состав Российской антарктической экспедиции"](#)
(Зарегистрировано в Минюсте России 28.02.2014 N 31460)
| A03FA ... **Метоклопрамид** ... раствор для инъекций, ампула 5 мг/мл 2 мл N 10 ... упаковка ... 1 ... 15
... 2 ... 2
- 4 Распоряжение Правительства РФ от 12.10.2019 N 2406-р (ред. от 09.06.2023)
[<Об утверждении перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, а также перечней лекарственных препаратов для медицинского применения и минимального ассортимента лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи>](#)
| A03FA ... стимуляторы моторики желудочно-кишечного тракта ... **метоклопрамид** ... раствор для внутривенного и внутримышечного введения; ... раствор для инъекций; ... раствор для приема внутрь; ... таблетки
- 5 ["Клинические рекомендации "Хронический болевой синдром \(ХБС\) у взрослых пациентов, нуждающихся в паллиативной медицинской помощи"](#)
(утв. Минздравом России)
| - Рекомендуется применять дофаминергические препараты, например, **метоклопрамид**** (A03FA стимуляторы моторики желудочно-кишечного тракта), галоперидол** (N05AD производные бутирофенона) для лечения тошноты и рвоты, связанных с приемом опиоидов [22, 34, 47, 138 -
- 6 ["Клинические рекомендации "Острый гепатит С \(ОГС\) у взрослых"](#)
(утв. Минздравом России)
| ...лактоулоза** - начальная суточная доза 15 - 45 мл, поддерживающая суточная дозировка 15 - 30 мл, домперидон 10 - 20 мг 2 раза в сутки внутрь, **метоклопрамид**** 20 мг 1 - 3 раза в сутки внутрь при тошноте и рвоте, гастроэзофагальном рефлюксе, метеоризме), так и адсорбирующие

7 "Клинические рекомендации "Острый гепатит А (ГА) у взрослых"

(утв. Минздравом России)

...лактолоза** - начальная суточная доза 15 - 45 мл, поддерживающая суточная дозировка 15 - 30 мл, домперидон 10 - 20 мг 2 раза в сутки внутрь, **метоклопрамид**** 20 мг 1 - 3 раза в сутки внутрь при тошноте и рвоте, гастроэзофагальном рефлюксе, метеоризме), так и адсорбирующие

8 "Клинические рекомендации "Болезнь Паркинсона, вторичный паркинсонизм и другие заболевания, проявляющиеся синдромом паркинсонизма"

(утв. Минздравом России)

Развитие паркинсонизма встречается также на фоне приема **метоклопрамида****, тетрабеназина**, флунаризина, циннаризина, антидепрессантов из группы селективных ингибиторов обратного захвата серотонина (СИОЗ), производных жирных кислот, карбамазепина**, фенитоина**,

9 "Клинические рекомендации "Гастрит и дуоденит"

(утв. Минздравом России)

...тримебутин нормализует опорожнение желудка [120]. По данным сетевого метаанализа, посвященного оценке препаратов с прокинетическим действием при функциональной диспепсии, тримебутин продемонстрировал сопоставимую с **метоклопрамидом**** и домперидоном

10 "Клинические рекомендации "Головная боль напряжения (ГБН)"

(утв. Минздравом России)

- Рекомендуется пациентам с ГБН и ЛИГБ с выраженной тошнотой и рвотой в период отмены препаратов, обладающих обезболивающим действием, назначать противорвотный препарат **метоклопрамид**** (10 мг 1 раз в сутки перорально или внутримышечно) в течение 5 - 7 дней [10 -

11 "Клинические рекомендации "Мигрень"

(утв. Минздравом России)

- Рекомендуется для лечения приступа мигрени у пациентов с тошнотой и/или рвотой противорвотный препарат (антиэметик) **метоклопрамид**** внутримышечно совместно с приемом анальгетика с целью облегчения этих симптомов и улучшения всасывания лекарственных

12 "Клинические рекомендации "Сальмонеллез у взрослых"

(утв. Минздравом России)

Повышение как секреции, так и моторики ЖКТ вызывают парасимпатомиметики и стимуляторы моторики желудочно-кишечного тракта (пилокарпин**, **метоклопрамид****), антихолинэстеразные средства (неостигмина метилсульфат**), ксантины (теофиллин и его комбинированные препараты,

13 "Клинические рекомендации "Острые порфирии"

(утв. Минздравом России)

Комментарии: **метоклопрамид**** в большинстве случаев использовался без осложнений в соответствии с зарегистрированными показаниями, кроме пациенток во время беременности. (<http://www.drugs-porphyrria.org/>) [4, 8, 9, 19, 41].

14 "Клинические рекомендации "Острый гепатит В (ГВ) у взрослых"

(утв. Минздравом России)

...лактолоза** - начальная суточная доза 15 - 45 мл, поддерживающая суточная дозировка 15 - 30 мл, домперидон 10 - 20 мг 2 раза в сутки внутрь, **метоклопрамид**** 20 мг 1 - 3 раза в сутки внутрь), так и адсорбирующие кишечные препараты (активированный уголь 1 - 2 г - 3 или 4 р...

15 "Клинические рекомендации "Синдром гиперстимуляции яичников"

(утв. Минздравом России)

- При наличии тошноты и рвоты с целью их купирования рекомендовано назначение **метоклопрамида**** как лекарственного препарата, не противопоказанного к применению во время беременности (24), (61).

16 "Клинические рекомендации "Острая неопухолевая кишечная непроходимость"

(утв. Минздравом России)

...функции ЖКТ (например, неостигмина метилсульфат** по 0,25 мг после операции и повторно каждые 4 - 6 часов в течение 3 - 4 дней, **метоклопрамид**** 10 - 20 мг 1 - 3 раза/сут). При неэффективности консервативной терапии пареза ЖКТ в течение 24 - 48 часов ставится вопрос о

17 "Клинические рекомендации "Роды одноплодные, родоразрешение путем кесарева сечения"

(утв. Минздравом России)

Ни один из препаратов, предложенных для профилактики аспирационного синдрома, не имеет доказательной базы, однако American Society of Anesthesiologists (2007, 2016) рекомендует использовать препараты алюминия фосфата, ранитидин и **метоклопрамид****.

18 "Клинические рекомендации "Многоплодная беременность"

(утв. Минздравом России)

...синдрома включает политику "ноль через рот" (прием прозрачной жидкости не менее чем за 2 часа, а твердой - не менее чем за 6 - 8 часов перед операцией). Рекомендованы блокаторы H2-гистаминовых рецепторов и/или **метоклопрамид****, антацидные средства и быстрая

19 "Клинические рекомендации "Опухоли невыявленной первичной локализации"

(утв. Минздравом России)

...противорвотные препараты (антагонисты NK1-рецепторов) (апрепитант или фосапрепитант), блокаторы серотониновых 5HT3-рецепторов (ондансетрон** и палонсетрон), дексаметазон**, стимуляторов моторики желудочно-кишечного тракта (**метоклопрамид****), анксиолитики,

- 20 ["Клинические рекомендации "Доброкачественная дисплазия молочной железы"](#)
(утв. Минздравом России)
- Комментарии: Причиной молочивных выделений может быть прием таких медикаментов, как антидепрессанты, домперидон, **метоклопрамид****, метилдопа**, верапамил** и комбинированные оральные контрацептивы (по анатомо-терапевтической-химической классификации (АТХ) -
- 21 ["Клинические рекомендации "Острый инфаркт миокарда с подъемом сегмента ST электрокардиограммы"](#)
(утв. Минздравом России)
- тошнота, рвота; устраняются производными фенотиазина, в частности, **метоклопрамидом**** (в/в 5 - 10 мг);
- 22 ["Клинические рекомендации "Острый коронарный синдром без подъема сегмента ST электрокардиограммы"](#)
(утв. Минздравом России)
- тошнота, рвота; устраняется фенотиазина производными, в частности, **метоклопрамидом**** (в/в 5 - 10 мг);
- 23 ["Клинические рекомендации "Хронический миелолейкоз"](#)
(утв. Минздравом России)
- Если токсичность, несмотря на все предпринятые мероприятия, составляет 2 степени, целесообразно назначение антиэметических препаратов: **метоклопрамид****, ондансетрон**, другие.
- 24 <Письмо> ФФОМС от 30.08.2018 N 10868/30/и
<О направлении Методических рекомендаций по организации и проведению контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи, оказанной пациентам с подозрением на онкологическое заболевание, и/или с установленным диагнозом онкологического (вместе с "Пособием по применению регламента деятельности страхового представителя 3 уровня")>
- Дексаметазон 8 мг внутрь или внутривенно в день 1 или 5-НТЗ-блокатор внутрь, в свечах или внутривенно за 30 - 60 мин до ХТ или **Метоклопрамид** 10 - 40 мг внутрь или внутривенно за 30 - 60 мин до ХТ.
- 25 ["Клинические рекомендации "Острый вирусный гепатит С у детей"](#)
(утв. Минздравом России)
- ...В зависимости от клинической симптоматики используются как препараты стимулирующие моторику ЖКТ, слабительные (домперидон** 10 - 15 мг 2 раза в сутки внутрь, **метоклопрамид**** детям 2 - 6 лет в дозе 0,5 - 1 мг/кг/сут, старше 6 лет - 5 - 10 мг 1 - 3 раза в...

- 26 Приказ Минздрава России от 23.05.2023 N 257н
"Об утверждении стандарта медицинской помощи взрослым при мигрени (диагностика и лечение)"
(Зарегистрировано в Минюсте России 27.06.2023 N 74006)
| ... **Метоклопрамид** ... 0,25 ... мг ... 20 ... 2 520
- 27 Приказ Минздрава России от 28.10.2020 N 1165н (ред. от 13.04.2023)
"Об утверждении требований к комплектации лекарственными препаратами и медицинскими изделиями укладок и наборов для оказания скорой медицинской помощи"
(Зарегистрировано в Минюсте России 26.11.2020 N 61099)
| 1.3.1 ... A03FA01 ... **метоклопрамид** ... **метоклопрамид** ... раствор для внутривенного и внутримышечного введения
- 28 Приказ Минздрава России от 09.02.2023 N 40н
"Об утверждении стандарта медицинской помощи взрослым при острых порфириях (диагностика, лечение и диспансерное наблюдение)"
(Зарегистрировано в Минюсте России 22.03.2023 N 72660)
| ... **Метоклопрамид** ... 0,2 ... мг ... 30 ... 1 350
- 29 Приказ Минздрава России от 01.02.2023 N 36н
"Об утверждении перечня лекарственных препаратов и фармакотерапевтических групп лекарственных препаратов, разрешенных к реализации в рамках эксперимента по осуществлению розничной торговли лекарственными препаратами для медицинского применения, отпускаемыми
(Зарегистрировано в Минюсте России 21.02.2023 N 72431)
| **Метоклопрамид** ... A03FA01 ... средства для лечения функциональных нарушений желудочно-кишечного тракта; ... прокинетики; ... противорвотное средство - дофаминовых рецепторов блокатор центральный ... таблетки; ... раствор для приема внутрь
- 30 Приказ Минздрава России от 09.01.2023 N 4н
"Об утверждении стандарта медицинской помощи взрослым при синдроме гиперстимуляции яичников (диагностика и лечение)"
(Зарегистрировано в Минюсте России 31.01.2023 N 72188)
| ... **Метоклопрамид** ... 0,0053 ... мг ... 20 ... 40
- 31 Приказ Минздрава России от 20.12.2012 N 1075н (ред. от 18.10.2022)
"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи несовершеннолетним при олигоменорее и аменорее"
(Зарегистрировано в Минюсте России 13.03.2013 N 27658)
| ... **Метоклопрамид** ... мг ... 10 ... 210

- 32 Приказ Минздрава России от 24.12.2012 N 1424н (ред. от 18.10.2022)
"Об утверждении стандарта первичной медико-санитарной помощи детям при олиго- и аменорее"
(Зарегистрировано в Минюсте России 25.03.2013 N 27876)
| ... **Метоклопрамид** ... мг ... 10 ... 20
- 33 Приказ Минздрава России от 06.10.2022 N 650н
"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи взрослым при острой неопухоловой кишечной непроходимости (диагностика и лечение)"
(Зарегистрировано в Минюсте России 09.11.2022 N 70868)
| ... **Метоклопрамид** ... 0,6 ... мг ... 40 ... 160
- 34 Приказ Минздрава России от 24.12.2012 N 1450н (ред. от 14.06.2022)
"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи детям при острых респираторных заболеваниях тяжелой степени тяжести"
(Зарегистрировано в Минюсте России 13.02.2013 N 27058)
| ... **Метоклопрамид** ... мг ... 15 ... 300
- 35 Приказ Минздрава России от 10.06.2021 N 612н (ред. от 27.05.2022)
"Об утверждении стандарта медицинской помощи взрослым при остром инфаркте миокарда с подъемом сегмента ST электрокардиограммы (диагностика, лечение и диспансерное наблюдение)"
(Зарегистрировано в Минюсте России 08.07.2021 N 64164)
| ... **Метоклопрамид** ... 0,05 ... мг ... 10 ... 10
- 36 Приказ Минздрава России от 23.10.2020 N 1144н (ред. от 22.02.2022)
"Об утверждении порядка организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих (Зарегистрировано в Минюсте России 03.12.2020 N 61238)
| 1.5.1 ... A03FA01 ... **Метоклопрамид** ... **метоклопрамид** ... таблетки
- 37 Приказ Минздрава России от 02.03.2021 N 158н
"Об утверждении стандарта медицинской помощи взрослым при остром коронарном синдроме без подъема сегмента ST электрокардиограммы (диагностика, лечение и диспансерное наблюдение)"
(Зарегистрировано в Минюсте России 12.04.2021 N 63094)
| ... **Метоклопрамид** ... 0,03 ... мг ... 10 ... 10
- 38 "Клинические рекомендации "Глутаровая ацидурия тип 1"
(утв. Минздравом России)
| Противорвотные средства ... #**метоклопрамид**** или #ондансетрон** в возрастной дозировке

- 39 [Приказ Минздрава России от 10.11.2020 N 1208н](#)
["Об утверждении стандарта медицинской помощи взрослым при мукополисахаридозе I типа"](#)
(Зарегистрировано в Минюсте России 08.02.2021 N 62426)
| ... **Метоклопрамид** ... 0,0008 ... мг ... 30 ... 1 560
- 40 [Приказ Минздрава России от 10.11.2020 N 1209н](#)
["Об утверждении стандарта медицинской помощи взрослым при мукополисахаридозе II типа"](#)
(Зарегистрировано в Минюсте России 28 января 2021 г. N 62255)
| ... **Метоклопрамид** ... 0,0008 ... мг ... 30 ... 1 560
- 41 [Приказ Минздрава России от 10.11.2020 N 1210н](#)
["Об утверждении стандарта медицинской помощи взрослым при мукополисахаридозе VI типа"](#)
(Зарегистрировано в Минюсте России 28.01.2021 N 62252)
| ... **Метоклопрамид** ... 0,0008 ... мг ... 30 ... 1 560
- 42 [Приказ Минздрава России от 30.10.2020 N 1183н](#)
["Об утверждении требований к комплектации лекарственными препаратами и медицинскими изделиями укладки для оказания первичной медико-санитарной помощи взрослым в неотложной форме"](#)
(Зарегистрировано в Минюсте России 24.11.2020 N 61082)
| 1.4 ... A03FA ... стимуляторы моторики желудочно-кишечного тракта ... **метоклопрамид** ... раствор для внутривенного и внутримышечного введения
- 43 ["Клинические рекомендации "Когнитивные расстройства у лиц пожилого и старческого возраста"](#)
(утв. Минздравом России)
| Алпразолам ... Арипипразол ... Атенолол** ... Каптоприл** ... Цетиризин** ... Хлорталидон ... Кодеин ... Безвременника осеннего семян экстракт Дезлоратадин ... Диазепам** ... Дигоксин** ... Дипиридамол ... Фентанил** ... Фуросемид** ... Флувоксамин ... Галоперидол** ... Гидрокортизон** ...
- 44 ["Клинические рекомендации "Острые лимфобластные лейкозы"](#)
(утв. Минздравом России)
| - прохлорперазин (перорально или в/в, 10 мг, каждые 4 - 6 ч); ... - **метоклопрамид**** (перорально или в/в, 10 - 40 мг, каждые 4 - 6 ч)
- 45 ["Клинические рекомендации "Артериальная гипертензия у взрослых"](#)
(утв. Минздравом России)
| Феохромоцитома ... < 1% ... Периодические симптомы: эпизоды повышения АД, головная боль, потливость, сердцебиения и бледность; лабильное АД; подъемы АД могут быть спровоцированы приемом препаратов (ББ, **метоклопрамида**, симпатомиметиков, опиоидов, трициклических

- 46 "Организация проведения профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения. Методические рекомендации"
(утв. Минздравом России 22.10.2019)
| Прокинетическое, противорвотное, противоикотное ... **Метоклопрамид** ... Церукал ...
| **Метоклопрамид** ... Одновременное применение с алкоголем может усиливать угнетающее действие алкоголя на ЦНС
- 47 Приказ Минздрава России от 24.12.2012 N 1500н (ред. от 10.05.2017)
"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи детям при злокачественных новообразованиях сетчатки (ретинобластоме)"
(Зарегистрировано в Минюсте России 05.03.2013 N 27499)
| ... **Метоклопрамид** ... мг ... 10 ... 20
- 48 Приказ Минздрава России от 07.11.2012 N 615н (ред. от 10.05.2017)
"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при новообразованиях гипофиза"
(Зарегистрировано в Минюсте России 22.01.2013 N 26655)
| ... **Метоклопрамид** ... мг ... 30 ... 450
- 49 Приказ Минздрава России от 01.07.2015 N 407абн
"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при переломе грудного отдела позвоночника, вывихе, растяжении и повреждении капсульно-связочного аппарата на уровне груди"
(Зарегистрировано в Минюсте России 29.07.2015 N 38249)
| ... **Метоклопрамид** ... мг ... 1 ... 2
- 50 Приказ Минздрава России от 01.07.2015 N 407ан
"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при травмах пояснично-крестцового отдела позвоночника и костей таза"
(Зарегистрировано в Минюсте России 17.07.2015 N 38073)
| ... **Метоклопрамид** ... мг ... 1 ... 2