

## Поиск по "Окситоцин"

- 1 ["ОФС.1.1.0014.15. Общая фармакопейная статья. Статистическая обработка результатов определения специфической фармакологической активности лекарственных средств биологическими методами"](#) (утв. и введена в действие Приказом Минздрава России от 31.10.2018 N 749) ("Государственная фармакопея Российской Федерации. XIV издание")
  - 3.3. Обработка результатов двухдозовой постановки методом случайных блоков (на примере биологической активности **окситоцина** на петушке)
- 2 [Общая фармакопейная статья "Статистическая обработка результатов определения специфической фармакологической активности лекарственных средств биологическими методами вып. 1. ОФС.1.1.0014.15"](#) ("Государственная фармакопея Российской Федерации. XIII издание. Том I")
  - 3.3. Обработка результатов двухдозовой постановки методом случайных блоков (на примере биологической активности **окситоцина** на петушке)
- 3 ["Обзор практики межгосударственных органов по защите прав и основных свобод человека N 10\(2020\)"](#) (подготовлен Верховным Судом РФ)
  - Краткая информация: автор утверждала, что патологизация ее родов посредством преждевременной госпитализации, выполнения ненужных вагинальных осмотров, введения **окситоцина** без предоставления информации или получения согласия, принуждения ее к
- 4 ["Пояснения к единой Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Содружества Независимых Государств \(ТН ВЭД СНГ\)"](#) (утв. решением Совета руководителей таможенных служб государств - участников Содружества Независимых Государств от 14.06.2017 N 10/65) (Том 2. Разделы VI (2/2) - VIII. Группы 29 - 43)
  - (10) **Окситоцин** (INN) (-гипофамин). Растворимый в воде полипептид. Его основное действие - сокращение матки и выделение молока молочными железами.
- 5 Постановление Правительства РФ от 14.02.2002 N 103 (ред. от 01.02.2005)  
["Об утверждении перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств и изделий медицинского назначения для бесплатного приобретения гражданами, постоянно проживающими \(работающими\) на территории зоны проживания с правом на отселение, в соответствии с пунктом](#)
  - 297. **Окситоцин** (раствор для инъекций)

6 "Методические рекомендации "Организация оказания медицинской помощи беременным, роженицам, родильницам и новорожденным при новой коронавирусной инфекции COVID-19. Версия 5 (28.12.2021)"

(утв. Минздравом России)

Рекомендуется при любом способе родоразрешения у рожениц с COVID-19 использовать минимально эффективные дозы утеротоников (**окситоцина**, карбетоцина) с профилактической и лечебной целью.

7 "Методические рекомендации по бухгалтерскому учету затрат и исчислению себестоимости продукции овцеводства"

(утв. Минсельхозом РФ 22.10.2008)

а) воспроизводство и окот - сперма (спермодозы), **окситоцин** и т.д.;

8 Приказ Росавиакосмоса от 15.08.2003 N 165

"Об утверждении Федеральных авиационных правил "Организация работы медицинского персонала авиационных организаций экспериментальной авиации"

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 22.09.2003 N 5101)

в) медикаменты и перевязочный материал (из расчета 100 обращений в месяц)

9 "Пояснения к единой Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза (ТН ВЭД ЕАЭС)"

(ред. от 03.12.2019) (Том II. Разделы VI - VIII. Группы 29 - 43)

(10) **Окситоцин** (INN) (-гипофамин). Растворимый в воде полипептид. Его основное действие - сокращение матки и выделение молока молочными железами.

10 "Государственный реестр лекарственных средств"

(по состоянию на 08.09.2023) (Часть 2)

**окситоцин** и его аналоги

11 "Государственный реестр лекарственных средств"

(по состоянию на 08.09.2023) (Часть 1)

ЛП-001582 ... 15.03.2012 ... ООО "ВИАЛ" ... Россия ... **Окситоцин**-Виал ... **Окситоцин** ... раствор для инъекций, 5 МЕ/мл, 1 мл - ампулы (10 шт.) - пачки картонные - По рецепту; ... Производитель (Все стадии, включая выпускающий контроль качества), Си Эс Пи Си Оуи Фармасьютикал Ко.Лтд, N 276

- 12 [Определение Третьего кассационного суда общей юрисдикции от 29.09.2021 N 88-15420/2021 по делу N 2-815/2020](#)  
Категория спора: Причинение вреда имуществу.  
Требования потерпевшего: О взыскании компенсации морального вреда.  
Обстоятельства: Как указывают истцы, некачественное оказание медицинской помощи повлекло гибель плода; между действиями врача и неблагоприятным исходом беременности имеется прямая причинно-следственная связь. В отношении работника вынесено постановление о прекращении уголовного преследования и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.  
Решение: Удовлетворено в части.
- Заключением комиссионной судебно-медицинской экспертизы ГКУЗ Ленинградской области Бюро судебно-медицинской экспертизы от 25.12.2018 N 141/к установлено, что гибель плода С.Л. наступила от интранатальной асфиксии (острой гипоксии), обусловленной резким угнетением маточно-плодового кровообращения с развитием декомпенсации хронической плацентарной недостаточности. При этом комиссия считает верифицированным факт развития острой гипоксии
- 13 [Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 11.08.2020 N 100 \(ред. от 25.10.2022\) "О Фармакопее Евразийского экономического союза"](#)
- 3.2.3. Метод случайных блоков с использованием двух доз (на примере биологической активности **окситоцина** на петушке)
- 14 [Приказ Росгидромета от 09.01.2014 N 1 "Об утверждении норм обеспечения бесплатным питанием, вещевым довольствием и лекарственными средствами лиц, входящих в состав Российской антарктической экспедиции"](#) (Зарегистрировано в Минюсте России 28.02.2014 N 31460)
- H01BB ... **Окситоцин** ... раствор для инъекций и местного применения, ампула 5 МЕ/мл 1 мл N 5 ... упаковка ... 1 ... 35 ... 2 ... 2
- 15 [Распоряжение Правительства РФ от 12.10.2019 N 2406-р \(ред. от 09.06.2023\) <Об утверждении перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, а также перечней лекарственных препаратов для медицинского применения и минимального ассортимента лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи>](#)
- H01BB ... **окситоцин** и его аналоги ... карбетоцин ... раствор для внутривенного введения; ... раствор для внутривенного и внутримышечного введения
- 16 ["Клинические рекомендации "Неудачная попытка стимуляции родов \(подготовка шейки матки к родам и родовозбуждение\)"](#) (утв. Минздравом России)
- Окситоцин**

- 17 "Клинические рекомендации "Послеродовое кровотечение"  
(утв. Минздравом России)  
| Приложение А3.1. Утеротонические препараты (АТХ: **Окситоцин** и его аналоги, АТХ:  
| Утеротонизирующие препараты) для лечения послеродовых кровотечений
- 18 "Клинические рекомендации "Инфекции амниотической полости и плодных оболочек  
(хориоамнионит)"  
(утв. Минздравом России)  
| Рекомендована индукция родов путем внутривенной инфузии **окситоцина\*\*** или родоусиление  
| при развитии слабости родовой деятельности [56, 57, 115 - 118].
- 19 "Клинические рекомендации "Признаки внутриутробной гипоксии плода, требующие  
предоставления медицинской помощи матери"  
(утв. Минздравом России)  
| - Рекомендовано для восстановления сердечного ритма плода прекратить действие  
| утеротонических препаратов (H01BB **Окситоцин** и его аналоги, G02AD02 Динопростон-система  
| вагинальная терапевтическая), использовать позиционную терапию, обеспечить регидратацию
- 20 "Клинические рекомендации "Оперативные влагалищные роды (Роды одноплодные,  
родоразрешение с наложением щипцов или с применением вакуум-экстрактора)"  
(утв. Минздравом России)  
| - Рекомендовано при вторичной слабости родовой деятельности, не поддающейся  
| консервативной терапии **окситоцином\*\***, рассмотреть возможность влагалищной  
| родоразрешающей операции в неотложном порядке [30] [32].
- 21 "Клинические рекомендации "Патологическое прикрепление плаценты (предлежание и вращение  
плаценты)"  
(утв. Минздравом России)  
| - Рекомендовано использовать **окситоцин** и его аналоги (H01BB) только после удаления плаценты  
| [85].
- 22 "Клинические рекомендации "Медицинская помощь матери при установленном или  
предполагаемом несоответствии размеров таза и плода. Лицевое, лобное или подбородочное  
предлежание плода, требующее предоставления медицинской помощи матери"  
(утв. Минздравом России)  
| Во время родов данные виды предлежаний ассоциированы с более длительным первым и  
| вторым периодами родов, инфузией **окситоцина**, использованием эпидуральной анальгезии,  
| хориоамнионитом, оперативными влагалищными родами, разрывами промежности третьей и

- 23 "Клинические рекомендации "Разрывы промежности при родоразрешении и другие акушерские травмы (акушерский травматизм)"  
(утв. Минздравом России)
- При угрожающем, начавшемся или свершившемся разрыве матки в родах рекомендовано немедленно остановить инфузию **окситоцина\*\*** в случае его применения [1].
- 24 "Клинические рекомендации "Эмболия амниотической жидкостью"  
(утв. Минздравом России)
- Профилактика **окситоцином** (H01BB: **окситоцин** и его производные) плюс другие утеротоники (G02A: Утеротонизирующие препараты) по мере необходимости
- 25 "Клинические рекомендации "Истмико-цервикальная недостаточность"  
(утв. Минздравом России)
- Комментарии: Существуют убедительные доказательства того, что ни один из указанных видов анестезии не увеличивает концентрацию эндогенного **окситоцина** и не влияет на результаты операции [96], [97]. Если пациентка находится в положении Тренделенбурга, при проведении
- 26 "Клинические рекомендации "Выкидыш (самопроизвольный аборт)"  
(утв. Минздравом России)
- Рекомендовано назначить 5 МЕ **окситоцина\*\*** внутривенно или внутримышечно после хирургического удаления плодного яйца с целью уменьшения объема кровопотери [86].
- 27 "Клинические рекомендации "Аменорея и олигоменорея"  
(утв. Минздравом России)
- ...обусловлен нарушением дофаминергического ингибирующего контроля секреции пролактина гипоталамусом, а также стимуляцией секреции пролактина тиреотропным гормоном (ТТГ), ГнРГ, ацетилхолином, серотонином, эндогенными опиоидами, гистамином, **окситоцином** [12]. Редкими
- 28 "Клинические рекомендации "Роды одноплодные, родоразрешение путем кесарева сечения"  
(утв. Минздравом России)
- В неотложном порядке (II категория неотложности) родоразрешение путем КС рекомендовано при отсутствии эффекта от родовозбуждения **окситоцином\*\*** [55].
- 29 "Клинические рекомендации "Многоплодная беременность"  
(утв. Минздравом России)
- Пациентке с многоплодием индукцию и родостимуляцию **окситоцином\*\*** рекомендовано проводить по тем же показаниям и в том же режиме, что и при родах одноплодной беременностью [104]. <8>

30 "Клинические рекомендации "Преэклампсия. Эклампсия. Отеки, протеинурия и гипертензивные расстройства во время беременности, в родах и послеродовом периоде"

(утв. Минздравом России)

Комментарий: В 3-м периоде родов для профилактики кровотечения вводят **окситоцин\*\*** 10 ЕД внутримышечно или 5 ЕД внутривенно капельно [146]. Введение указанных препаратов должно выполняться после нормализации АД.

31 "Клинические рекомендации "Роды одноплодные, самопроизвольное родоразрешение в затылочном предлежании (нормальные роды)"

(утв. Минздравом России)

- Рекомендовано парентеральное введение **окситоцина\*\*** или карбетоцина\*\* в третьем периоде родов для профилактики послеродового кровотечения вследствие атонии матки [100 - 104].

32 "Клинические рекомендации "Послеоперационный рубец на матке, требующий предоставления медицинской помощи матери во время беременности, родов и в послеродовом периоде"

(утв. Минздравом России)

...повышает риск разрыва матки в 2,9 раза по сравнению с пациентками без индукции, в 1,3 раза - по сравнению с применением **окситоцина\*\*** [52, 53]. Преиндукция родов механическими расширителями не противопоказана беременным с рубцом на матке после КС [4, 46, 54].

33 "Клинические рекомендации "Тазовое предлежание плода"

(утв. Минздравом России)

- При наличии показаний с целью родовозбуждения рекомендована индукция родов раствором **окситоцина\*\*** [9, 51, 52].

34 "Клинические рекомендации "Преждевременные роды"

(утв. Минздравом России)

- В качестве первой линии токолитической терапии рекомендованы **нифедипин\*\*** (блокатор "медленных" кальциевых каналов) [65 - 67] и **атозибан\*\*** (препарат, блокирующий рецепторы **окситоцина**) [68].

35 "Клинические рекомендации "Затрудненные роды [дистоция] вследствие предлежания плечика"

(утв. Минздравом России)

Комментарии: С затянувшимся длительным течением 2-го периода родов могут быть связаны такие факторы риска, как родостимуляция **окситоцином\*\***, выраженная конфигурация головки с образованием большой родовой опухоли, раннее форсирование потуг (при положении головки

- 36 ["Клинические рекомендации "Внутрипеченочный холестаза при беременности"](#)  
(утв. Минздравом России)
- Повышенное количество желчных кислот в крови беременной с ВХБ может стимулировать выделение простагландинов, повышать чувствительность миометрия к **окситоцину** и его контрактильность, что в 12 - 44% случаев вызывает преждевременные роды [22].
- 37 ["Клинические рекомендации "Острые лимфобластные лейкозы"](#)  
(утв. Минздравом России)
- Рекомендуется пациенткам в послеродовом периоде проведение утеротонической терапии (**окситоцином\*\***) и медикаментозное подавление лактации [87]
- 38 Приказ Минсельхоза России от 02.11.2022 N 776 (ред. от 19.01.2023)  
["Об утверждении порядка назначения лекарственных препаратов для ветеринарного применения, перечня лекарственных средств для ветеринарного применения, в том числе антимикробных препаратов для ветеринарного применения, отпускаемых по рецепту на лекарственный препарат](#)  
(Зарегистрировано в Минюсте России 30.11.2022 N 71227)
- ОКСИТОЦИН**
- 39 Приказ Минздрава России от 09.01.2023 N 2н  
["Об утверждении стандарта медицинской помощи при свершившемся выкидыше \(самопроизвольном аборте\) и неразвивающейся беременности \(диагностика и лечение\) и о внесении изменений в стандарт специализированной медицинской помощи при самопроизвольном](#)  
(Зарегистрировано в Минюсте России 31.01.2023 N 72190)
- H01BB ... **Окситоцин** и его аналоги
- 40 Приказ Минздрава России от 07.11.2012 N 590н (ред. от 09.01.2023)  
["Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при самопроизвольном прерывании беременности"](#)  
(Зарегистрировано в Минюсте России 15.05.2013 N 28409)
- H01BB ... **Окситоцин** и его аналоги ... 0,2
- 41 ["Клинические рекомендации "Соматическая дисфункция"](#)  
(утв. Минздравом России)
- Повышение уровня **окситоцина** в плазме ... [129]
- 42 Приказ Минздрава России от 13.10.2017 N 804н (ред. от 24.09.2020, с изм. от 26.10.2022)  
["Об утверждении номенклатуры медицинских услуг"](#)  
(Зарегистрировано в Минюсте России 07.11.2017 N 48808)
- A09.05.116 ... Исследование уровня **окситоцина** в крови

- 43 Приказ Минздрава России от 20.10.2020 N 1130н  
"Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю "акушерство и гинекология"  
(Зарегистрировано в Минюсте России 12.11.2020 N 60869)  
| В/м инъекция 10 МЕ **окситоцина** время [ ]:[ ]
- 44 "Клинические рекомендации "Брадиаритмии и нарушения проводимости"  
(утв. Минздравом России)  
| С метилэргометрином\*\*, **окситоцином\*\*** - увеличение вазоконстрикторного эффекта, риск возникновения ишемии и гангрены, а также тяжелой артериальной гипертензии, вплоть до внутрочерепного кровоизлияния.
- 45 Приказ Минздрава России от 10.05.2017 N 203н  
"Об утверждении критериев оценки качества медицинской помощи"  
(Зарегистрировано в Минюсте России 17.05.2017 N 46740)  
| 9. ... Выполнено введение лекарственных препаратов группы **окситоцина** и его аналогов и/или группы утеротонизирующие не позднее 10 минут от момента установления диагноза (в зависимости от медицинских показаний и при отсутствии медицинских противопоказаний) ... Да/
- 46 Приказ Минздрава России от 07.11.2012 N 615н (ред. от 10.05.2017)  
"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при новообразованиях гипофиза"  
(Зарегистрировано в Минюсте России 22.01.2013 N 26655)  
| A09.05.116 ... Исследование уровня **окситоцина** в крови ... 1 ... 1
- 47 Рекомендация Коллегии Евразийской экономической комиссии от 29.12.2015 N 30  
"О Правилах отнесения лекарственных препаратов с учетом действующих веществ, входящих в их состав, к категориям лекарственных препаратов, отпускаемых без рецепта и по рецепту"  
| **Окситоцин** ... H01BB02 ... I (1)
- 48 Приказ Минздрава России от 24.12.2012 N 1401н  
"Об утверждении стандарта скорой медицинской помощи при кровотечении из женских половых органов"  
(Зарегистрировано в Минюсте России 13.03.2013 N 27637)  
| 3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз



- 49 Приказ Минздрава России от 24.12.2012 N 1473н  
"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи женщинам при аномальных кровотечениях (маточных и влагалищных) различного генеза"  
(Зарегистрировано в Минюсте России 01.04.2013 N 27957)
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз
- 50 Приказ Минздрава России от 07.11.2012 N 597н  
"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при кровотечении в связи с предлежанием плаценты, требующим медицинской помощи матери"  
(Зарегистрировано в Минюсте России 25.03.2013 N 27857)
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз