

## Поиск по "Преднизолон"

- 1 ["МУК 4.1.923-99. 4.1. Методы контроля. Химические факторы. Методические указания по измерению концентраций прегнадиен-1,4-триол-11бета,17-альфа,21-диона-3,20 \(преднизолона\) в воздухе рабочей зоны методом высокоэффективной жидкостной хроматографии"](#)  
(утв. Минздравом России 30.12.1999)
- 2 ["Пояснения к единой Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Содружества Независимых Государств \(ТН ВЭД СНГ\)"](#)  
(утв. решением Совета руководителей таможенных служб государств - участников Содружества Независимых Государств от 14.06.2017 N 10/65) (Том 2. Разделы VI (2/2) - VIII. Группы 29 - 43)  
| (г) **преднизолон** (INN) (дегидрогидрокортизон). Глюкокортикоид. Производное гидрокортизона;
- 3 Постановление Правительства РФ от 14.02.2002 N 103 (ред. от 01.02.2005)  
["Об утверждении перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств и изделий медицинского назначения для бесплатного приобретения гражданами, постоянно проживающими \(работающими\) на территории зоны проживания с правом на отселение, в соответствии с пунктом](#)  
| 261. **Преднизолон** (таблетки, мазь, глазные капли, порошок для инъекций, раствор для инъекций)
- 4 Заключение Палаты по патентным спорам от 02.09.2022 (Приложение к решению Роспатента от 02.11.2022 по заявке N 0000024186)  
[<О признании действия евразийского патента на изобретение на территории Российской Федерации недействительным частично>](#)  
| Приведенные в источнике [5] сведения не свидетельствуют об увеличении продолжительности жизни пациента при приеме кабазитаксела в отношении какого-либо вида рака, поскольку, не представлены данные о выживаемости и отсутствуют сведения о гидратах, сольватах в
- 5 ["Временные методические рекомендации "Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции \(COVID-19\). Версия 17 \(09.12.2022\)"](#)  
(утв. Минздравом России) (вместе с "Рекомендациями по описанию данных РГ И КТ ОГК",  
"Инструкцией по проведению диагностики COVID-19 с применением методов амплификации  
| ...больного в ОРИТ или 3 - 6 дней после начала ИВЛ. Факторы риска развития COVID-ИА: ИВЛ, ОРДС, применение ГКС в дозе по **преднизолону** более 60 мг/сут., использование иммуносупрессоров, лимфоцитопения  $1,0 \times 10^9/\text{л}$ , нейтропения  $0,5 \times 10^9/\text{л}$  более 10 суток,
- 6 ["Временные методические рекомендации "Порядок проведения вакцинации против новой коронавирусной инфекции \(COVID-19\)"](#)  
(утв. Минздравом России)  
| Дополнительно за 30 минут до вакцинации можно ввести парентерально (особенно у пациентов с анафилактическим шоком в анамнезе) **преднизолон** 1 мг/кг веса или дексаметазон 0,3 мг/кг.

- 7 ["Методические рекомендации "Организация оказания медицинской помощи беременным, роженицам, родильницам и новорожденным при новой коронавирусной инфекции COVID-19. Версия 5 \(28.12.2021\)"](#)  
(утв. Минздравом России)
- Если нет показаний для назначения ГКС для созревания легких плода, **преднизолон** 40 мг принимают внутрь 1 раз в день или гидрокортизон 80 мг 2 раза в день внутривенно.
- 8 [Приказ Министра обороны РФ от 27.04.2009 N 265 "Об утверждении Федеральных авиационных правил медицинского обеспечения полетов государственной авиации"](#)  
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 09.07.2009 N 14293)
- В этом случае достаточно дать кислород, после спуска уложить на кушетку, приподнять ноги под углом 15 градусов, освободить тело от стесняющей одежды, дать вдохнуть нашатырный спирт. Ввести подкожно 1 мл 10%-ного кофеина или 2 мл кордиамина, внутривенно 30 мг
- 9 [Приказ Росавиакосмоса от 15.08.2003 N 165 "Об утверждении Федеральных авиационных правил "Организация работы медицинского персонала авиационных организаций экспериментальной авиации"](#)  
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 22.09.2003 N 5101)
- в) медикаменты и перевязочный материал (из расчета 100 обращений в месяц)
- 10 [Приказ Минморфлота СССР от 03.05.1989 N 56 <О введении в действие Правил морской перевозки опасных грузов \(Правила МОПОГ\) РД 31.15.01-89>](#)  
(вместе с "РД 31.15.01-89. Правила морской перевозки опасных грузов (Правила МОПОГ)")
- 400 мл реополиглюкина; неокамненсан; альбумин; гидролизин; декстран; гидрокортизон; **преднизолон**; подкожно: витамины В1, В6, АТФ, кокарбоксылаза; аскорбиновая кислота; оксигенотерапия.
- 11 ["Пояснения к единой Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза \(ТН ВЭД ЕАЭС\)"](#)  
(ред. от 03.12.2019) (Том II. Разделы VI - VIII. Группы 29 - 43)
- (г) **преднизолон** (INN) (дегидрогидрокортизон). Глюкокортикоид. Производное гидрокортизона;
- 12 Обзор:  
["Стандарт первичной медпомощи детям при юношеском артрите с системным началом заменили новым"](#)  
(КонсультантПлюс, 2019)
- Некоторые препараты продолжают применяться: метилпреднизолон, **преднизолон**, метотрексат, тоцилизумаб, циклоспорин, мелоксикам, нимесулид.

13 ["Государственный реестр лекарственных средств"](#)  
(по состоянию на 08.09.2023) (Часть 2)

**ПреднизолонПреднизолон**

14 ["Государственный реестр лекарственных средств"](#)  
(по состоянию на 08.09.2023) (Часть 1)

**ПреднизолонПреднизолон**

15 Справочная информация:  
["Санитарно-эпидемиологическое нормирование"](#)  
(Материал подготовлен специалистами КонсультантПлюс)

Методические указания МУК 4.1.923-99 "Методические указания по измерению концентраций прегнадиен-1,4-триол-11бета,17-альфа,21-диона-3,20 (**преднизолона**) в воздухе рабочей зоны методом высокоэффективной жидкостной хроматографии" ... Главный государственный

16 Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 14.09.2021 N 80 (ред. от 29.08.2023)  
["Об утверждении единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза и Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза, а также об изменении и признании утратившими силу некоторых решений Совета](#)

... 2937 21 000 0 ...-- кортизон, гидрокортизон, преднизон (дегидрокортизон) и **преднизолон** (дегидрогидрокортизон) ... г ... 0

17 Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 24.01.2023 N 10  
["О применении приложения 3 к Соглашению о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами, с одной стороны, и Социалистической Республикой Вьетнам, с другой стороны, от 29 мая 2015 года"](#)

2937.21 ...-- Кортизон, гидрокортизон, преднизон (дегидрокортизон) и **преднизолон** (дегидрогидрокортизон) ... СТН или VAC 40%

18 Решение Высшего Евразийского экономического совета от 08.05.2015 N 16 (ред. от 12.05.2022)  
["О перечне чувствительных товаров, в отношении которых решение об изменении ставки ввозной таможенной пошлины принимается Советом Евразийской экономической комиссии"](#)

2937 21 000 0 ...-- кортизон, гидрокортизон, преднизон (дегидрокортизон) и **преднизолон** (дегидрогидрокортизон)

19 Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 17.04.2018 N 55  
["О применении приложения 3 к Соглашению о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами, с одной стороны, и Социалистической Республикой Вьетнам, с другой стороны, от 29 мая 2015 года"](#)

2937.21 ...-- Кортизон, гидрокортизон, преднизон (дегидрокортизон) и **преднизолон** (дегидрогидрокортизон) ... СТН или VAC 40%

- 20 "Единая товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Содружества независимых государств (ТН ВЭД СНГ)"  
(на основе 7-го издания Гармонизированной системы описания и кодирования товаров, вступающая в силу 1 января 2022 года)  
2937 21 000 ...-- кортизон, гидрокортизон, преднизон (дегидрокортизон) и **преднизолон** (дегидрогидрокортизон) ... г
- 21 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 02.12.2020 N 40  
"Об утверждении санитарных правил СП 2.2.3670-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда"  
(Зарегистрировано в Минюсте России 29.12.2020 N 61893)  
35... 57-22-7 ... 671-16-9 ... 50-24-8 ... 55-86-7 ... Комбинированная химиотерапия с использованием винкристина, прокарбазина, **преднизолона**, а также эмбихина и других алкилирующих агентов (лс) ... инг, ч/к
- 22 Приказ МЧС России от 15.12.2002 N 583 (ред. от 26.06.2018)  
"Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны"  
(Зарегистрировано в Минюсте России 25.03.2003 N 4317)  
62. ... **Преднизолон**, раствор для внутривенного и внутримышечного введения или раствор для инъекций, 30 мг/мл, 1 мл в ампуле ... амп. ... 3
- 23 Приказ Минтранса России от 03.06.2014 N 148  
"Об утверждении требований к подготовке авиационного персонала органов и служб единой системы авиационно-космического поиска и спасания в Российской Федерации, а также авиационных сил поиска и спасания к проведению поисково-спасательных операций (работ), а  
(Зарегистрировано в Минюсте России 30.10.2014 N 34534)  
29 ... **Преднизолон** 30 мг раствор по 1 мл ... ампула ... 10
- 24 Приказ Росгидромета от 09.01.2014 N 1  
"Об утверждении норм обеспечения бесплатным питанием, вещевым довольствием и лекарственными средствами лиц, входящих в состав Российской антарктической экспедиции"  
(Зарегистрировано в Минюсте России 28.02.2014 N 31460)  
H02AB ... **Преднизолон** ... мазь для наружного применения 0,5% 10 г ... туба ... 1 ... 15 ... 2 ... 2
- 25 "Р 2.2.2006-05. 2.2. Гигиена труда. Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда"  
(утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 29.07.2005)  
12 ... Комбинированная химиотерапия с использованием винкристина, прокарбазина, **преднизолона**, эмбихина и других алкилирующих агентов ... <\*\*\*\*> ... -

- 26 [Распоряжение Правительства РФ от 12.10.2019 N 2406-р \(ред. от 09.06.2023\)](#)  
<Об утверждении перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, а также перечней лекарственных препаратов для медицинского применения и минимального ассортимента лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи>
- | ... **преднизолон** ... мазь для наружного применения; ... раствор для внутривенного и внутримышечного введения; ... раствор для инъекций; ... таблетки
- 27 ["Клинические рекомендации "Трансплантация поджелудочной железы, наличие трансплантированной поджелудочной железы, отмирание и отторжение трансплантата поджелудочной железы"](#)  
(утв. Минздравом России)
- | 3.3.4. **Преднизолон\*\***, метилпреднизолон\*\*
- 28 ["Пояснения к единой Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза \(ТН ВЭД ЕАЭС\)"](#)  
(ред. от 06.10.2020) (Том VI. Разделы I - XXI. Группы 01 - 97)
- | 2937 21 000 0 ... Кортизон, гидрокортизон, преднизон (дегидрокортизон) и **преднизолон** (дегидрогидрокортизон)
- 29 [Распоряжение Правительства РФ от 06.07.2010 N 1141-р \(ред. от 01.08.2020\)](#)  
<Об утверждении перечня стратегически значимых лекарственных средств>
- | 145.... **Преднизолон**
- 30 [Постановление Правительства РФ от 28.03.2017 N 339 \(ред. от 23.08.2021\)](#)  
<Об утверждении перечня субстанций и (или) методов, запрещенных для использования в спорте, для целей статей 230.1 и 230.2 Уголовного кодекса Российской Федерации>
- | **преднизолон**;
- 31 ["Клинические рекомендации "Прогрессирующая мышечная дистрофия Дюшенна. Прогрессирующая мышечная дистрофия Беккера"](#)  
(утв. Минздравом России)
- | - Рекомендуется назначение терапии препаратом **#преднизолон\*\*** в дозе 0,75 мг/кг/сутки перорально после завершения формирования двигательных навыков, но до начала угасания моторных функций (на стадии плато), всем пациентам с МДД/МДБ с целью снижения
- 32 ["Клинические рекомендации "Крапивница"](#)  
(утв. Минздравом России)
- | Комментарии: для купирования острого эпизода коротким курсом (у взрослых до 10 дней, у детей - 3 - 7 сут.) может использоваться перорально **преднизолон\*\*** в дозе 20 - 50 мг/сут у взрослых и в дозировке 1 - 2 мг/кг/сут у детей.

- 33 "Клинические рекомендации "Гемангиома инфантильная"  
(утв. Минздравом России)
- Пациентам с ИГ с низкой массой тела, недоношенностью, трудностями со вскармливанием, с эпизодами гипогликемии в анамнезе перед началом терапии РР, а также пациентам, получающим комбинированную терапию **#преднизолоном\*\*** и РР рекомендуется исследование уровня глюкозы
- 34 "Клинические рекомендации "Трансплантация сердца, наличие трансплантированного сердца, отмирание и отторжение трансплантата сердца"  
(утв. Минздравом России)
- ...0,5 мг/кг с постепенным снижением к концу 6-й недели после ТС до 0,05 - 0,1 мг/кг. Доза **преднизолона\*\*** снижается до 0,2 мг/кг/сутки с последующим снижением до 0,05 мг/кг к 4 неделе после ТС. С целью...
- 35 "Клинические рекомендации "Периодический синдром, ассоциированный с мутацией гена рецептора фактора некроза опухоли (TRAPS) (Другие уточненные нарушения с вовлечением иммунного механизма, не классифицированные в других рубриках)"  
(утв. Минздравом России)
- Рекомендуется назначение назначается **преднизолона\*\*** (H02AB) или **#метилпреднизолона\*\*** (H02AB) перорально в дозе 0,5 - 1 мг/кг в сутки пациентам с установленным диагнозом TRAPS на этапе обследования, при выраженном болевом синдроме и/или, опасных для жизни системных
- 36 "Клинические рекомендации "Криопирин-ассоциированные периодические синдромы (Другие уточненные нарушения с вовлечением иммунного механизма, не классифицированные в других рубриках)"  
(утв. Минздравом России)
- Рекомендуется назначение **#преднизолона\*\*** (H02AB) или **#метилпреднизолона\*\*** (H02AB) перорально 1 мг/кг в сутки пациентам с установленным диагнозом CAPS на этапе обследования, при выраженном болевом синдроме и/или, опасных для жизни системных проявлениях (стойкая
- 37 "Клинические рекомендации "Семейная средиземноморская лихорадка (Наследственный семейный амилоидоз)"  
(утв. Минздравом России)
- Рекомендуется назначение **#преднизолона\*\*** (H02AB) или **#метилпреднизолона\*\*** (H02AB) перорально в дозе 1 мг/кг в сутки пациентам с затяжной фебрильной миалгией с целью достижения противовоспалительного эффекта [5, 30, 51, 128 - 131].
- 38 "Клинические рекомендации "Проксимальная спинальная мышечная атрофия 5q"  
(утв. Минздравом России)
- За 24 часа до и после инфузии онасемноген абепарвовета необходима иммуномодуляция глюкокортикоида (**#преднизолон\*\*** перорально из расчета 1 мг/кг/сут или эквивалентная доза другого глюкокортикоида) [101, 105 - 107].

- 39 ["Клинические рекомендации "Грибовидный микоз"](#)  
(утв. Минздравом России)
- ...кап., день 1, Циклофосфамид\*\* 750 мг/м<sup>2</sup> в/в кап., день 1, #Винкристин\*\* 1,4 мг/м<sup>2</sup> (суммарно не более 2 мг) в/в, день 1, #**Преднизолон**\*\* 100 мг внутрь, дни 1 - 5, цикл 21 день, всего 6 циклов [59 - 62, 71 - 75].
- 40 Приказ Минспорта России от 18.11.2022 N 1013  
["Об утверждении перечней субстанций и \(или\) методов, запрещенных для использования в спорте"](#)  
(Зарегистрировано в Минюсте России 21.12.2022 N 71723)
- Запрещены все глюкокортикоиды при введении любым инъекционным, пероральным, в том числе оромукозальным, например, буккальным, гингивальным и сублингвальным, или ректальным способом, в том числе: беклометазон; бетаметазон; будесонид; гидрокортизон; дексаметазон;
- 41 ["Клинические рекомендации "Лекарственные поражения печени \(ЛПП\) у взрослых"](#)  
(утв. Минздравом России)
- ...варианта ответа на терапию ГКС и динамическое наблюдение, при этом аутоиммуноподобное ЛПП после отмены ГКС не рецидивирует в отличие от истинного АИГ. #**Преднизолон**\*\* назначается в дозе 40 - 60 мг/сутки в течение 3 - 5 дней, затем 20 мг/сутки с последующим постепенным
- 42 ["Клинические рекомендации "Перикардиты"](#)  
(утв. Минздравом России)
- Следует использовать глюкокортикоиды в малых дозах #**преднизолон**\*\* 0,2 - 0,5 мг/кг в день или в эквивалентных дозах другие глюкокортикоиды.
- 43 ["Клинические рекомендации "Черепно-мозговая травма у детей"](#)  
(утв. Минздравом России)
- Рекомендуются Глюкокортикоиды - **преднизолон**\*\* (код АТХ N02AB (Глюкокортикостероиды))
- 44 ["Клинические рекомендации "Эпилепсия и эпилептический статус у взрослых и детей"](#)  
(утв. Минздравом России)
- ...спазмов применяются разные гормоны для системного применения, но только у двух препаратов в инструкции к применению есть показание эпилепсии; и оба препарата на момент написания клинических рекомендаций не зарегистрированы в РФ. Для назначения других
- 45 ["Клинические рекомендации "Острый гепатит С \(ОГС\) у детей"](#)  
(утв. Минздравом России)
- ...также тяжелыми формами без признаков печеночной прекомы - комы, но с выраженными проявлениями интоксикации и их прогрессированием, несмотря на проводимую активную инфузионную терапию с целью подавления иммунопатологических, воспалительных реакций и

46 "Клинические рекомендации "Мононевропатии"

(утв. Минздравом России)

- Рекомендуется применение пероральных глюкокортикоидов - пероральное применение **преднизолона\*\*** в дозировке 20 мг ежедневно в течение 10 - 14 дней [53 - 55].

47 "Клинические рекомендации "Туберкулез у взрослых"

(утв. Минздравом России)

- Рекомендуется назначение глюкокортикоидов (**преднизолона\*\***) в качестве адъювантной терапии при лечении пациентов с МЛУ ТБ в следующих случаях: при туберкулезе центральной нервной системы, милиарном туберкулезе, серозитах (плеврит, перикардит) туберкулезной

48 "Клинические рекомендации "Эмболия амниотической жидкостью"

(утв. Минздравом России)

Комментарий: Используются следующие дозировки: #гидрокортизон\*\* 500 мг внутривенно, затем каждые 6 часов (до 2 г/24 ч) или #**преднизолон\*\*** в дозе 360 - 420 мг, через 10 - 15 минут 280 - 360 мг внутривенно из расчета суммарной дозы 700 - 800 мг/сут, в последующие 2 суток назначают...

49 "Клинические рекомендации "Острый гепатит В (ОГВ) у детей"

(утв. Минздравом России)

...а также тяжелыми формами без признаков печеночной прекомы - комы, но с выраженными проявлениями интоксикации и их прогрессированием, несмотря на проводимую активную инфузионную терапию с целью подавления иммунопатологических, воспалительных реакций и

50 "Клинические рекомендации "Пневмония (внебольничная)"

(утв. Минздравом России)

- При метапневмоническом плеврите рекомендуются кортикостероиды системного действия - обычно #**преднизолон\*\*** (внутри 1 мг/кг/сутки в течение 3 - 4 дней)), который способствует снижению лихорадки и СОЭ за 1 - 2 суток, улучшает общее состояние, что позволяет быстро