

Поиск по "Спиринолактон"

- 1 ["МУК 4.1.1682-03. 4.1. Методы контроля. Химические факторы. Спектрофотометрическое измерение массовых концентраций \(7альфа,17альфа\)-7-\(ацетилтио\)-17-гидрокси-3-оксопрегн-4-ен-21-карбоновой кислоты гамма-лактона \(спиринолактон\) в воздухе рабочей зоны. Методические \(утв. Минздравом России 29.06.2003\)](#)
- 2 ["Государственная фармакопея Российской Федерации. XII издание. Часть 1"](#)
| **Спиринолактон** (ФС 42-0277-07)
- 3 [Постановление Правительства РФ от 14.02.2002 N 103 \(ред. от 01.02.2005\)](#)
["Об утверждении перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств и изделий медицинского назначения для бесплатного приобретения гражданами, постоянно проживающими \(работающими\) на территории зоны проживания с правом на отселение, в соответствии с пунктом](#)
| [286. Спиринолактон](#) (таблетки)
- 4 [Справочная информация:](#)
["Правовой календарь на IV квартал 2022 года"](#)
(Материал подготовлен специалистами КонсультантПлюс)
| Новый перечень содержит 31 позицию (ранее - 23). В числе прочего в него включены Ацетазоламид, Дигоксин, Ивабрадин, **Спиринолактон**.
- 5 ["Государственный реестр лекарственных средств"](#)
(по состоянию на 08.09.2023) (Часть 2)
| **Спиринолактон**
- 6 ["Государственный реестр лекарственных средств"](#)
(по состоянию на 08.09.2023) (Часть 1)
| **СпиринолактонСпиринолактон**
- 7 [Справочная информация:](#)
["Санитарно-эпидемиологическое нормирование"](#)
(Материал подготовлен специалистами КонсультантПлюс)
| Методические указания МУК 4.1.1682-03 "Спектрофотометрическое измерение массовых концентраций (7альфа,17альфа)-7-(ацетилтио)-17-гидрокси-3-оксопрегн-4-ен-21-карбоновой кислоты гамма-лактона (**спиринолактон**) в воздухе рабочей зоны" ... Главный государственный

- 8 Решение Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 N 299 (ред. от 29.08.2023)
"О применении санитарных мер в Евразийском экономическом союзе"
| 4. **Спиронолактон** ... Spironolactone
- 9 Решение Комиссии Таможенного союза от 23.09.2011 N 799 (ред. от 15.04.2022)
"О принятии технического регламента Таможенного союза "О безопасности парфюмерно-косметической продукции"
(вместе с "ТР ТС 009/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности парфюмерно-косметической продукции")
| 4 ... **Спиронолактон** (INN) ... Spironolactone (INN) ... 52-01-7 ... 200-133-6
- 10 Приказ Росгидромета от 09.01.2014 N 1
"Об утверждении норм обеспечения бесплатным питанием, вещевым довольствием и лекарственными средствами лиц, входящих в состав Российской антарктической экспедиции"
(Зарегистрировано в Минюсте России 28.02.2014 N 31460)
| C03DA ... **Спиронолактон** ... таблетки 25 мг N 20 ... упаковка ... 1 ... 35 ... 5 ... 3
- 11 Распоряжение Правительства РФ от 12.10.2019 N 2406-р (ред. от 09.06.2023)
<Об утверждении перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, а также перечней лекарственных препаратов для медицинского применения и минимального ассортимента лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи>
| C03DA ... антагонисты альдостерона ... **спиронолактон** ... капсулы; ... таблетки
- 12 Распоряжение Правительства РФ от 06.07.2010 N 1141-р (ред. от 01.08.2020)
<Об утверждении перечня стратегически значимых лекарственных средств>
| 165... **Спиронолактон**
- 13 Постановление Правительства РФ от 28.03.2017 N 339 (ред. от 23.08.2021)
"Об утверждении перечня субстанций и (или) методов, запрещенных для использования в спорте, для целей статей 230.1 и 230.2 Уголовного кодекса Российской Федерации"
| амилорид; ацетазоламид; буметанид; ваптаны (например, толваптан); индапамид; канренон; метолазон; **спиронолактон**; тиазиды (например, бендрофлуметиазид, гидрохлоротиазид и хлоротиазид); триамтерен; фуросемид; хлорталидон и этакриновая кислота.
- 14 "Клинические рекомендации "Трехпредсердное сердце"
(утв. Минздравом России)
| ...2 - 3,3 мг/кг/сут в 2 приема, старше 6 месяцев - 2 мг/кг/сут в 2 приема [73]. Калийсберегающий диуретик #**Спиронолактон**** (Калийсберегающие диуретики/Альдостерона антагонисты/C03DA01) может применяться вместе с тиазидами у детей в рамках препарата off label в дозе...

- 15 "Клинические рекомендации "Трансплантация сердца, наличие трансплантированного сердца, отмирание и отторжение трансплантата сердца"
(утв. Минздравом России)
...лишь в одном из отделов сердечно-сосудистой системы в малом или большом круге кровообращения, которые купируются на фоне медикаментозной терапии, включающей диуретики, ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента или антагонисты рецепторов
- 16 Приказ Минспорта России от 18.11.2022 N 1013
"Об утверждении перечней субстанций и (или) методов, запрещенных для использования в спорте"
(Зарегистрировано в Минюсте России 21.12.2022 N 71723)
амилорид; ацетазоламид; буметанид; ваптаны (например, толваптан); индапамид; канренон; метолазон; **спиронолактон**; тиазиды (например, бендрофлуметиазид, гидрохлоротиазид и хлоротиазид); торасемид, триамтерен; фуросемид; хлорталидон и этакриновая кислота и другие
- 17 "Клинические рекомендации "Врожденная митральная недостаточность (ВМН)"
(утв. Минздравом России)
...2 - 3,3 мг/кг/сут в 2 приема, старше 6 месяцев - 2 мг/кг/сут в 2 приема [136]. Калийсберегающий диуретик **#Спиронолактон**** (Калийсберегающие диуретики/Альдостерона антагонисты/C03DA01) может применяться вместе с тиазидами у детей в рамках препарата off label в дозе...
- 18 "Клинические рекомендации "Сахарный диабет 2 типа у взрослых"
(утв. Минздравом России)
...Антагонисты рецепторов минералокортикоидов (АТХ-классификация C03DA антагонисты альдостерона) (**спиронолактон****, эплеренон) эффективны в лечении резистентной гипертензии, снижают альбуминурию по данным непродолжительных исследований пациентов с ХБП и могут
- 19 "Клинические рекомендации "Единственный желудочек сердца"
(утв. Минздравом России)
...фуросемида** (противопоказано применение таблетированной лекарственной формы у детей до 3-х лет), доза у детей - внутривенно 0,5 - 2 мг/кг или per os 1 - 2 мг/кг каждые 6 - 12 часов [28, 30]; **#спиронолактона****, доза у детей - 1 - 4 мг/кг/сутки [29, 30].
- 20 "Клинические рекомендации "Врожденный стеноз клапана легочной артерии"
(утв. Минздравом России)
...сочетание "петлевых" диуретиков (фуросемид** максимальная суточная доза 6 мг/кг/сут (твердая лекарственная форма off-label у детей младше 3-х лет), с калийсберегающими диуретиками (**спиронолактон**** 1 - 3 мг/кг/сут (твердая лекарственная форма off-label у детей младше 3-х лет).

- 21 "Клинические рекомендации "Хроническая болезнь почек"
(утв. Минздравом России)
-- антигипертензивные препараты и антагонисты альдостерона, например, **спиронолактон****, ингибиторы АПФ, например, каптоприл.
- 22 "Клинические рекомендации "Цирроз и фиброз печени"
(утв. Минздравом России)
- Рекомендовано в дополнение к бессолевой диете назначать калийсберегающий диуретик, антагонист альдостерона - (**спиронолактон**** в начальной дозировке 100 мг/сутки пациентам с ЦП и впервые возникшим умеренным асцитом [1, 2, 84, 85, 183].
- 23 "Клинические рекомендации "Дефект предсердно-желудочковой перегородки (Атриовентрикулярный канал)"
(утв. Минздравом России)
Комментарии: при появлении признаков перегрузки правых отделов сердца (по данным ЭхоКГ или ЭКГ) препаратом выбора из диуретиков является **#спиронолактон****, который назначается в дозе 2 - 3,5 мг/кг/сут в 2 приема.
- 24 "Клинические рекомендации "Тотальный аномальный дренаж легочных вен"
(утв. Минздравом России)
...off-label у детей до 18 лет), длительность применения препаратов определяется индивидуально в каждом конкретном случае) и диуретическая терапия, в случаях, когда декомпенсация кровообращения сопровождается отечным синдромом (фуросемид** 0,5 - 2,0 мг/кг в сутки,
- 25 "Клинические рекомендации "Кистозный фиброз (муковисцидоз)"
(утв. Минздравом России)
В комплексной терапии используются калийсберегающие диуретики - **спиронолактон**** (противопоказан детям до 3 лет) из расчета 1 - 3 мг/кг.
- 26 "Клинические рекомендации "Синдром поликистозных яичников"
(утв. Минздравом России)
...рекомендуется оценка биохимической гиперандрогении у женщин, принимающих комбинированные оральные контрацептивы (по анатомо-терапевтической-химической классификации (АТХ) - Прогестагены и эстрогены (фиксированные сочетания)) или иные гормон-
- 27 "Клинические рекомендации "Хроническая болезнь почек (ХБП)"
(утв. Минздравом России)
- Мы рекомендуем использование антагонистов минералкортикоидных рецепторов (АМКР) (**спиронолактон**** или эплеренон) у пациентов ХБП С1 - С3, АГ и градацией альбуминурии \geq А2 для снижения АД и мочевой экскреции белка [261 - 263].

- 28 "Клинические рекомендации "Преэклампсия. Эклампсия. Отеки, протеинурия и гипертензивные расстройства во время беременности, в родах и послеродовом периоде"
(утв. Минздравом России)
- Не рекомендованы ингибиторы АПФ**, антагонисты рецепторов ангиотензина II (АТ1-подтип)**, **спиронолактон****, блокаторы "медленных" кальциевых каналов: дилтиазем и фелодипин [59, 60, 68, 71 - 76].
- 29 "Клинические рекомендации "Легочная гипертензия, в том числе хроническая тромбоэмболическая легочная гипертензия"
(утв. Минздравом России)
- Целесообразно сочетание петлевых диуретиков (фуросемид**, торасемид**) с антагонистами альдостерона (**спиронолактон****, эплеренон), а при выраженном застое - с ингибиторами карбоангидразы (ацетазоламид).
- 30 "Клинические рекомендации "Острый инфаркт миокарда с подъемом сегмента ST электрокардиограммы"
(утв. Минздравом России)
- ...предпочтительно назначать эплеренон в первые сутки от начала ИМ [142]. Есть указания на снижение риска смерти при альдостерона антагонистов, в том числе **спиронолактона****, у всех пациентов ИМпST при отсутствии противопоказаний и независимо от наличия сердечной
- 31 "Клинические рекомендации "Гипертрофическая кардиомиопатия"
(утв. Минздравом России)
- Данные, полученные Maron M.S. и соавт. (2018) в проспективном рандомизированном двойном слепом исследовании, не подтверждают использование **спиронолактона** при ГКМП для улучшения ремоделирования ЛЖ путем уменьшения фиброза миокарда или изменения
- 32 "Клинические рекомендации "Стабильная ишемическая болезнь сердца"
(утв. Минздравом России)
- Рекомендуется рассмотреть возможность назначения **спиронолактона**** (25 мг/сут) или эплеренона у пациентов, перенесших ИМ, которые уже получают терапевтические дозы ингибитора АПФ и бета-адреноблокатора, имеют ФВ ЛЖ 35%, а также СД или СН для
- 33 "Клинические рекомендации "Хроническая сердечная недостаточность"
(утв. Минздравом России)
- В этом случае дополнительно к иАПФ и рекомендуется присоединение альдостерона антагонистов (эплеренона или **спиронолактона****) [186, 204, 205, 215].

- 34 "Клинические рекомендации "Артериальная гипертензия у взрослых"
(утв. Минздравом России)
| - Пациентам с АГ, не достигшим целевого АД на фоне тройной комбинированной терапии, рекомендуется добавление **спиронолактона** (подробнее в разделе 3.6.11) [106, 137, 138, 169].
- 35 Приказ Минздрава России от 11.09.2023 N 469н
"Об утверждении перечня лекарственных препаратов в целях обеспечения пациентов, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием (Зарегистрировано в Минюсте России 13.09.2023 N 75200)
| 27. ... **Спиронолактон** ... таблетки; ... капсулы ... 25 мг, ... 50 мг
- 36 Приказ Минздрава России от 01.02.2023 N 36н
"Об утверждении перечня лекарственных препаратов и фармакотерапевтических групп лекарственных препаратов, разрешенных к реализации в рамках эксперимента по осуществлению розничной торговли лекарственными препаратами для медицинского применения, отпускаемыми (Зарегистрировано в Минюсте России 21.02.2023 N 72431)
| **Спиронолактон** ... C03DA01 ... диуретики; ... калийсберегающие диуретики; ... антагонисты альдостерона; ... диуретическое калийсберегающее средство ... таблетки; ... капсулы
- 37 Приказ Минздрава России от 28.12.2022 N 810н
"Об утверждении стандарта медицинской помощи взрослым при циррозе и фиброзе печени (диагностика и лечение)"
(Зарегистрировано в Минюсте России 19.01.2023 N 72063)
| ... **Спиронолактон** ... 0,77 ... мг ... 200 ... 72 600
- 38 Приказ Минздрава России от 20.12.2012 N 1075н (ред. от 18.10.2022)
"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи несовершеннолетним при олигоменорее и аменорее"
(Зарегистрировано в Минюсте России 13.03.2013 N 27658)
| ... **Спиронолактон** ... мг ... 200 ... 4000
- 39 Приказ Минздрава России от 24.12.2012 N 1424н (ред. от 18.10.2022)
"Об утверждении стандарта первичной медико-санитарной помощи детям при олиго- и аменорее"
(Зарегистрировано в Минюсте России 25.03.2013 N 27876)
| ... **Спиронолактон** ... мг ... 400 ... 4000

- 40 Приказ Минздрава России от 29.09.2022 N 639н
"Об утверждении перечня лекарственных препаратов для медицинского применения в целях обеспечения в амбулаторных условиях лиц, находящихся под диспансерным наблюдением, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым (Зарегистрировано в Минюсте России 27.10.2022 N 70725)
| 27. ... **Спиронолактон** ... таблетки; ... капсулы ... 25 мг, ... 50 мг, ... 100 мг
- 41 Приказ Минздрава России от 20.04.2022 N 272н
"Об утверждении стандарта медицинской помощи взрослым при хронической сердечной недостаточности (диагностика, лечение и диспансерное наблюдение)"
(Зарегистрировано в Минюсте России 02.06.2022 N 68714)
| ... **Спиронолактон** ... 0,25 ... мг ... 50 ... 18 250
- 42 Приказ Минздрава России от 24.12.2012 N 1554н (ред. от 20.04.2022)
"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при сердечной недостаточности"
(Зарегистрировано в Минюсте России 20.03.2013 N 27789)
| ... **Спиронолактон** ... мг ... 100 ... 1400
- 43 "Клинические рекомендации "Туберкулез у взрослых"
(утв. Минздравом России)
| 6. При неэффективности, выраженной гипокалиемии (< 2,5 ммоль/л) дополнительно назначить **спиронолактон**** 25 - 50 мг/сут;
- 44 "Клинические рекомендации "Туберкулез у детей"
(утв. Минздравом России)
| 6. При неэффективности, выраженной гипокалиемии (< 2,5 ммоль/л) дополнительно назначить **спиронолактон**** 25 - 50 мг/сут;
- 45 Приказ Минздрава России от 06.08.2021 N 835н
"Об утверждении стандарта медицинской помощи детям при кистозном фиброзе (муковисцидозе) (диагностика, лечение и диспансерное наблюдение)"
(Зарегистрировано в Минюсте России 03.09.2021 N 64889)
| ... **Спиронолактон** ... 0,013 ... мг ... 80 ... 800
- 46 Приказ Минздрава России от 02.11.2020 N 1193н
"Об утверждении стандартов медицинской помощи взрослым при артериальной гипертензии"
(Зарегистрировано в Минюсте России 15.02.2021 N 62496)
| ... **Спиронолактон** ... 0,18 ... мг ... 50 ... 18 250

- 47 Приказ Минздрава России от 01.07.2015 N 397ан
"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи детям при разрыве
внутричерепных тканей и кровоизлиянии вследствие родовой травмы, других родовых травмах
центральной нервной системы, внутричерепных нетравматических кровоизлияниях, судорогах
(Зарегистрировано в Минюсте России 14.07.2015 N 38003)
| ... **Спиринолактон** ... мг ... 5 ... 25
- 48 Рекомендация Коллегии Евразийской экономической комиссии от 29.12.2015 N 30
"О Правилах отнесения лекарственных препаратов с учетом действующих веществ, входящих в их
состав, к категориям лекарственных препаратов, отпускаемых без рецепта и по рецепту"
| **Спиринолактон** ... C03DA01 ... II
- 49 Приказ Минздрава России от 29.12.2012 N 1657н
"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при других врожденных
аномалиях (пороках развития) сердечной перегородки"
(Зарегистрировано в Минюсте России 07.03.2013 N 27559)
| 3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на
территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз
- 50 Приказ Минздрава России от 29.12.2012 N 1655н
"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при врожденном стенозе
аортального клапана"
(Зарегистрировано в Минюсте России 22.03.2013 N 27845)
| 3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на
территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз