

Поиск по "Ванкомицин"

- 1 ["КонсультантПлюс: Новости для специалиста организации здравоохранения"](#)
То же касается больных с инфекцией из-за метициллин-резистентного золотистого стафилококка, **ванкомицин**-резистентного энтерококка или микроорганизмов с экстремальной резистентностью.
- 2 ["Пояснения к единой Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Содружества Независимых Государств \(ТН ВЭД СНГ\)"](#)
(утв. решением Совета руководителей таможенных служб государств - участников Содружества Независимых Государств от 14.06.2017 N 10/65) (Том 2. Разделы VI (2/2) - VIII. Группы 29 - 43)
(7) Прочие антибиотики, например, саркомицин, **ванкомицин**.
- 3 Постановление Правительства РФ от 14.02.2002 N 103 (ред. от 01.02.2005)
["Об утверждении перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств и изделий медицинского назначения для бесплатного приобретения гражданами, постоянно проживающими \(работающими\) на территории зоны проживания с правом на отселение, в соответствии с пунктом](#)
79. **Ванкомицин** (порошок для инъекций)
- 4 ["Временные методические рекомендации "Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции \(COVID-19\). Версия 17 \(09.12.2022\)"](#)
(утв. Минздравом России) (вместе с "Рекомендациями по описанию данных РГ И КТ ОГК",
"Инструкцией по проведению диагностики COVID-19 с применением методов амплификации
<1> При наличии аллергических реакций немедленного типа на любой бета-лактам предпочтение нужно отдавать АБП с другой химической структурой (например, может назначаться респираторный хинолон в комбинации с линезолидом или **ванкомицином**).
- 5 ["Методические рекомендации "Организация оказания медицинской помощи беременным, роженицам, родильницам и новорожденным при новой коронавирусной инфекции COVID-19. Версия 5 \(28.12.2021\)"](#)
(утв. Минздравом России)
...обнаружения инфицирования золотистым стафилококком, в том числе MRSA [2, 16, 48, 102].
Учитывая этот факт, у отдельных категорий пациентов (недавно перенесенные оперативные вмешательства, госпитализации, наличие постоянного внутривенного катетера, диализ)
- 6 ["Пояснения к единой Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза \(ТН ВЭД ЕАЭС\)"](#)
(ред. от 03.12.2019) (Том II. Разделы VI - VIII. Группы 29 - 43)
(7) Прочие антибиотики, например, саркомицин, **ванкомицин**.

7 "Государственный реестр лекарственных средств"
(по состоянию на 08.09.2023) (Часть 2)

Ванкомицин ДжВанкомицин

8 "Государственный реестр лекарственных средств"
(по состоянию на 08.09.2023) (Часть 1)

Ванкомицин ДжВанкомицин

9 Распоряжение Правительства РФ от 12.10.2019 N 2406-р (ред. от 09.06.2023)
<Об утверждении перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, а также перечней лекарственных препаратов для медицинского применения и минимального ассортимента лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи>

J01XA ... антибиотики гликопептидной структуры ... **ванкомицин** ... лиофилизат для приготовления раствора для инфузий; ... лиофилизат для приготовления раствора для инфузий и приема внутрь; ... порошок для приготовления раствора для инфузий; ... порошок для приготовления раствора

10 "Клинические рекомендации "Инфекции амниотической полости и плодных оболочек (хориоамнионит)"
(утв. Минздравом России)

...цефокситин** 2 г внутривенно каждые 8 ч или цефтриаксон** 1 г каждые 24 ч, в тяжелых случаях суточную дозу можно увеличить до 4 г [4, 68, 75, 86 - 89]. При аллергической реакции на пенициллины рекомендовано назначение //клиндамицина** или //**ванкомицина**** в сочетании с //

11 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 4 (ред. от 25.05.2022)
"Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"
(вместе с "СанПиН 3.3686-21. Санитарные правила и нормы...") (Зарегистрировано в Минюсте России 15.02.2021 N 62500)

...В отношении пациентов с инфекцией любой локализации, независимо от срока ее возникновения, вызванной метициллин (оксациллин) резистентными стафилококками, **ванкомицин**-резистентными энтерококками, грамотрицательными микроорганизмами -

12 "Клинические рекомендации "Черепно-мозговая травма у детей"
(утв. Минздравом России)

...Инtrateкальное введение антибактериальных препаратов системного действия осуществляют в разведении физиологическим раствором хлорида натрия** (код АТХ B05XA). Предпочтительно применение #**Ванкомицина**** 5 мг инtrateкально (код АТХ J01XA01) Антибиотики гликопептидной

- 13 ["Клинические рекомендации "Саркомы костей"](#)
(утв. Минздравом России)
- При наличие высокого риска контаминации раны грам + MRS инфекцией: #**Ванкомицин**** 15 - 20 мг/кг за 2 часа до разреза кожи. [114 - 115]
- 14 ["Методические рекомендации "Стандарт диагностики и лечения новой коронавирусной инфекции \(COVID-19\) у военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации. Версия 3 от 08.10.2021"](#)
(утв. Минобороны России 08.10.2021)
- Выбор режима антимикробной терапии необходимо осуществлять на основании выявления факторов риска резистентных возбудителей, анализа предшествующей терапии, результатов микробиологической диагностики (пиперациллин/тазобактам, цефепим/сульбактам, меропенем,
- 15 ["Клинические рекомендации "Переломы проксимального отдела бедренной кости"](#)
(утв. Минздравом России)
- ...препаратов для периоперационной антибиотикопрофилактики инфекции в области хирургического вмешательства при проведении хирургического лечения пациентов с ППОБК рекомендуется использовать цефазолин** [1], препаратами резерва (например при
- 16 ["Клинические рекомендации "Инфекционный эндокардит и инфекция внутрисердечных устройств"](#)
(утв. Минздравом России)
- ...стадии заболевания; (3) гемодинамическая недостаточность на фоне СН или тяжелого сепсиса или после кардиохирургического лечения; (4) токсичность антибиотиков (острый интерстициальный нефрит), связанный с аминогликозидами, **ванкомицином**** (синергизм с
- 17 ["Клинические рекомендации "Цирроз и фиброз печени"](#)
(утв. Минздравом России)
- **Ванкомицин**-резистентные энтерококки [32, 56, 57].
- 18 ["Клинические рекомендации "Дефект предсердно-желудочковой перегородки \(Атриовентрикулярный канал\)"](#)
(утв. Минздравом России)
- Комментарии: в тяжелых случаях целесообразно использование антибактериальных препаратов резерва: карбапенемы, **ванкомицин****, фторхинолоны, макролиды, полимиксины.
- 19 ["Клинические рекомендации "Язвенный колит"](#)
(утв. Минздравом России)
- Комментарии: Препаратом выбора для лечения колита, ассоциированного с C.difficile при язвенном колите является **ванкомицин**** (перорально) [32].

20 "Клинические рекомендации "Послеоперационная вентральная грыжа"

(утв. Минздравом России)

- Пациентам с ПВГ при хирургическом лечении рекомендуется за 30 - 60 минут до операции применение цефалоспорины первого или второго поколения или #амоксциллин+клавулановая кислота**, в стандартных дозировках. В рамках целевой профилактики (доказанный риск MRSA)

21 "Клинические рекомендации "Кистозный фиброз (муковисцидоз)"

(утв. Минздравом России)

- Возможной альтернативой является использование #ванкомицина** в форме для инъекционного применения ингаляционно (применение вне зарегистрированных в инструкции лекарственного средства показаний осуществляется по решению врачебной комиссии, с разрешения Локального

22 "Клинические рекомендации "Острый обструктивный ларингит [круп] и эпиглоттит"

(утв. Минздравом России)

При неэффективности терапии (если инфекция вызвана S.aureus!) внутривенно Клиндамицин** в дозе 30 мг/кг/сут или Ванкомицин** в дозе 40 мг/кг/сут.

23 "Клинические рекомендации "Внебольничная пневмония у взрослых"

(утв. Минздравом России)

Частота выявления S. pneumoniae, резистентных к цефтриаксону**, составила 5,4%. Большинство пневмококков, включая пенициллинорезистентные (ПРП), сохраняют чувствительность к цефтаролина фосамилу**, все - к линезолиду**, ванкомицину**.

24 "Клинические рекомендации "Роды одноплодные, родоразрешение путем кесарева сечения"

(утв. Минздравом России)

...с ИМТ 35 кг/м² (на 48 часов) [236]. При выборе антибиотика необходимо учитывать грудное вскармливание [237]. У пациенток с известной колонизацией метициллин-резистентным S.aureus (MRSA) при КС допускается добавление разовой дозы ванкомицина** к рекомендованной схеме

25 "Клинические рекомендации "Роды одноплодные, самопроизвольное родоразрешение в затылочном предлежании (нормальные роды)"

(утв. Минздравом России)

...профилактики [63]. При аллергии на бета-лактамы антибиотики и наличии данных лабораторного исследования об устойчивости S. agalactiae к клиндамицину может быть использован #ванкомицин** внутривенно в дозе 20 мг/кг каждые 8 часов, максимальная разовая

26 "Клинические рекомендации "Перелом верхней челюсти"

(утв. Минздравом России)

с - за 120 минут до разреза при применении ванкомицина**

- 27 "МУ 3.5.1.3674-20. 3.5.1. Дезинфектология. Обеззараживание рук медицинских работников и кожных покровов пациентов при оказании медицинской помощи. Методические указания"
(утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 14.12.2020)
- Среди грамотрицательных микроорганизмов возбудителями ИСМП могут быть *Pseudomonas aeruginosa*, *Acinetobacter baumannii*, *Klebsiella* spp. (в частности, *Klebsiella pneumoniae*), *Enterococcus* spp., в том числе **ванкомицин**-резистентный энтерококк (VRE), *Salmonella* spp., а
- 28 "Клинические рекомендации "Язвенный колит"
(утв. Минздравом России)
- При отсутствии клинического эффекта от метронидазола** через 5 - 7 дней производят смену препарата на **ванкомицин**** в дозе 1000 мг в день per os в течение 10 дней для достижения терапевтического эффекта и улучшения качества жизни пациента [174, 176, 178, 186].
- 29 "Клинические рекомендации "Гепатобластома"
(утв. Минздравом России)
- Не рекомендовано пациентам во время или сразу после введения #цисплатина** использование нефротоксичных антибактериальных препаратов группы аминогликозидов (амикацин**, гентамицин**), антибиотиков гликопептидной структуры (**ванкомицин****) [38, 39].
- 30 "Клинические рекомендации "Саркомы костей"
(утв. Минздравом России)
- ...Одной из рекомендуемых схем антибактериальной терапии высокого риска является применение цефалоспоринов третьего поколения в комбинации с клиндомицином или **ванкомицином** в течение всего периода нахождения пациента в стационаре, обычно от 10 до 14
- 31 Приказ Минздрава России от 16.01.2023 N 11н
"Об утверждении стандарта медицинской помощи взрослым при коксартрозе (диагностика, лечение и диспансерное наблюдение) и о внесении изменения в стандарт первичной медико-санитарной помощи при осложнениях, связанных с внутренними ортопедическими протезными устройствами,
(Зарегистрировано в Минюсте России 20.02.2023 N 72403)
- ... **Ванкомицин** ... 0,014 ... мг ... 2 100 ... 2 100
- 32 Приказ Минздрава России от 05.10.2022 N 648н
"Об утверждении стандарта медицинской помощи взрослым при отморожении, гипотермии, других эффектах воздействия низкой температуры (диагностика и лечение)"
(Зарегистрировано в Минюсте России 09.11.2022 N 70867)
- ... **Ванкомицин** ... 0,092 ... г ... 2 ... 20

- 33 Приказ Минздрава России от 04.10.2022 N 646н
"Об утверждении стандарта медицинской помощи взрослым при ожогах термических и химических, ожогах солнечных, ожогах дыхательных путей (диагностика и лечение)"
(Зарегистрировано в Минюсте России 09.11.2022 N 70871)
| ... **Ванкомицин** ... 0,056 ... г ... 2 ... 16
- 34 Приказ Минздрава России от 24.12.2012 N 1450н (ред. от 14.06.2022)
"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи детям при острых респираторных заболеваниях тяжелой степени тяжести"
(Зарегистрировано в Минюсте России 13.02.2013 N 27058)
| ... **Ванкомицин** ... мг ... 1600 ... 16000
- 35 Приказ Минздрава России от 02.06.2022 N 377н
"Об утверждении стандарта медицинской помощи взрослым при кистозном фиброзе (муковисцидозе) (диагностика и лечение)"
(Зарегистрировано в Минюсте России 06.07.2022 N 69168)
| ... **Ванкомицин** ... 0,034 ... г ... 2 ... 112
- 36 Приказ Минздрава России от 01.06.2022 N 369н
"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи взрослым при переломе нижней челюсти (диагностика и лечение)"
(Зарегистрировано в Минюсте России 06.07.2022 N 69172)
| ... **Ванкомицин** ... 0,066 ... мг ... 1 050 ... 1 050
- 37 Приказ Минздрава России от 12.05.2022 N 317н
"Об утверждении стандарта медицинской помощи детям при отморожении, гипотермии, других эффектах воздействия низкой температуры (диагностика и лечение)"
(Зарегистрировано в Минюсте России 20.06.2022 N 68903)
| ... **Ванкомицин** ... 0,092 ... мг ... 800 ... 8 000
- 38 Приказ Минздрава России от 01.04.2022 N 232н
"Об утверждении стандарта медицинской помощи взрослым при переломе верхней челюсти (диагностика и лечение)"
(Зарегистрировано в Минюсте России 01.07.2022 N 69112)
| ... **Ванкомицин** ... 0,028 ... мг ... 1 050 ... 1 050
- 39 Приказ Минздрава России от 01.04.2022 N 233н
"Об утверждении стандарта медицинской помощи взрослым при переломе скуловой кости (диагностика и лечение)"
(Зарегистрировано в Минюсте России 04.05.2022 N 68404)
| ... **Ванкомицин** ... 0,028 ... мг ... 1 050 ... 1 050

- 40 ["Клинические рекомендации "Пневмония \(внебольничная\)"](#)
(утв. Минздравом России)
| Стационарное лечение - любой возраст ... Амоксициллин + клавулановая кислота** в/в ... ИЛИ ... Ампициллин** в/в или в/м ... ИЛИ ... Другой препарат группы "комбинации пенициллинов, включая комбинации с ингибиторами" в/в или в/м ... ИЛИ ... ЦС 3-го поколения (Цефтриаксон**,
41 [Приказ Минсельхоза России от 18.11.2021 N 771](#)
["Об утверждении Перечня лекарственных препаратов, предназначенных для лечения инфекционных и паразитарных болезней животных, вызываемых патогенными микроорганизмами и условно-патогенными микроорганизмами, в отношении которых вводится ограничение на \(Зарегистрировано в Минюсте России 29.11.2021 N 66038\)](#)
| Гликопептиды: ... **ванкомицин**
42 [Приказ Минздрава России от 06.08.2021 N 835н](#)
["Об утверждении стандарта медицинской помощи детям при кистозном фиброзе \(муковисцидозе\) \(диагностика, лечение и диспансерное наблюдение\)"](#)
(Зарегистрировано в Минюсте России 03.09.2021 N 64889)
| ... **Ванкомицин** ... 0,032 ... мг ... 1 800 ... 25 200
43 ["Клинические рекомендации "Инфекция мочевыводящих путей у детей"](#)
(утв. Минздравом России)
| E.faecalis, ампициллиночувствительные штаммы ... Ампициллин** +/- Гентамицин** ... Линезолид**
... **Ванкомицин****
44 ["Клинические рекомендации "Перелом нижней челюсти"](#)
(утв. Минздравом России)
| - Хирургическое лечение пациентов с закрытым переломом нижней челюсти наружным доступом без риска сообщения операционной раны с полостью рта ... Цефазолин** <2> 1,0 - 2,0 - 3,0 г ... или ... Цефуроксим** 1,5 г ... **Ванкомицин**** <3> 15 мг/кг ... Или ... #Клиндамицин** 0,6 - 0,9 г ... [63, 65,
45 ["Клинические рекомендации "Перелом скуловой кости"](#)
(утв. Минздравом России)
| Хирургическое лечение пациентов с закрытым переломом СК наружным доступом без риска сообщения операционной раны с полостью рта/полостью носа ... Цефазолин** <2> 1,0 - 2,0 - 3,0 г, ... либо Цефуроксим** 1,5 г ... **Ванкомицин**** <1>, <3> 15 мг/кг ... За 30 - 60 мин. до разреза ...
46 [Приказ Минздрава России от 29.12.2012 N 1690н \(ред. от 10.05.2017\)](#)
["Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи детям при ретинобластоме \(средний риск\)"](#)
(Зарегистрировано в Минюсте России 17.04.2013 N 28157)
| ... **Ванкомицин** ... мг ... 1200 ... 12000

- 47 Приказ Минздрава России от 29.12.2012 N 1686н (ред. от 10.05.2017)
"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи детям при нейробластоме (средний риск)"
(Зарегистрировано в Минюсте России 05.03.2013 N 27489)
| ... **Ванкомицин** ... мг ... 1200 ... 12000
- 48 Приказ Минздрава России от 07.11.2012 N 615н (ред. от 10.05.2017)
"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при новообразованиях гипофиза"
(Зарегистрировано в Минюсте России 22.01.2013 N 26655)
| ... **Ванкомицин** ... 0,5 ... мг ... 2000 ... 20000
- 49 Приказ Минздрава России от 01.07.2015 N 407абн
"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при переломе грудного отдела позвоночника, вывихе, растяжении и повреждении капсульно-связочного аппарата на уровне груди"
(Зарегистрировано в Минюсте России 29.07.2015 N 38249)
| ... **Ванкомицин** ... мг ... 2000 ... 2000
- 50 Приказ Минздрава России от 01.07.2015 N 407ан
"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при травмах пояснично-крестцового отдела позвоночника и костей таза"
(Зарегистрировано в Минюсте России 17.07.2015 N 38073)
| ... **Ванкомицин** ... мг ... 2000 ... 10000