

## Поиск по "Варфарин"

- 1 ["Методические рекомендации. Периоперационное ведение взрослых пациентов, получающих длительную анти тромботическую терапию"](#)  
(утв. Президиумом Общероссийской общественной организации "Федерация анестезиологов и реаниматологов" 26.05.2021, Общим собранием Национальной Ассоциации специалистов по  
| Приложение Г6. Дооперационный этап мост-терапии после отмены **варфарина**
- 2 ["ОСТ 91500.11.0007-2003. Отраслевой стандарт. Протокол ведения больных. Профилактика тромбоэмболии легочной артерии при хирургических и иных инвазивных вмешательствах"](#)  
(утв. Приказом Минздрава России от 09.06.2003 N 233)  
| **Варфарин** (warpharinum)
- 3 ["Временные методические рекомендации "Оказание амбулаторно-поликлинической медицинской помощи пациентам с хроническими заболеваниями, подлежащим диспансерному наблюдению, в условиях пандемии COVID-19. Версия 2"](#)  
(утв. ФГБУ "НМИЦ ТПМ" Минздрава России (протокол от 19.10.2021 N 10))  
| ...АВК, дабигатран, ривароксабан и апиксабан), показало, что после 12 месяцев лечения дабигатран имел самые низкие показатели риска госпитализации по поводу повреждения печени (**варфарин** 9,0; ривароксабан 6,6; апиксабан 5,6; дабигатран 4,0 на 1000 человеко-лет). Таким
- 4 ["Ветеринарно-санитарные правила по организации и проведению дератизационных мероприятий"](#)  
(утв. Минсельхозом РФ 14.03.2001 N 13-5-02/0043)  
| Зоокумарин (**варфарин**) в дозе 1 мг/кг живой массы при многократном потреблении вызывает гибель животных, особенно поросят после кастрации, когда у них повреждены кровеносные сосуды.
- 5 ["Государственный реестр лекарственных средств"](#)  
(по состоянию на 08.09.2023) (Часть 2)  
| Измененный
- 6 ["Государственный реестр лекарственных средств"](#)  
(по состоянию на 08.09.2023) (Часть 1)  
| **Варфарин**
- 7 Решение Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 N 299 (ред. от 29.08.2023)  
["О применении санитарных мер в Евразийском экономическом союзе"](#)  
| 203. **Варфарин** и его соли ... Warfarin and its salts

- 8 Решение Комиссии Таможенного союза от 23.09.2011 N 799 (ред. от 15.04.2022)  
"О принятии технического регламента Таможенного союза "О безопасности парфюмерно-косметической продукции"  
(вместе с "ТР ТС 009/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности парфюмерно-косметической продукции")  
| 203 ... **Варфарин** (INN) и его соли ... Warfarin (INN) and its salts ... 81-81-2 ... 201-337-6
- 9 Приказ Росгидромета от 09.01.2014 N 1  
"Об утверждении норм обеспечения бесплатным питанием, вещевым довольствием и лекарственными средствами лиц, входящих в состав Российской антарктической экспедиции"  
(Зарегистрировано в Минюсте России 28.02.2014 N 31460)  
| В01АА ... **Варфарин** ... таблетки 2,5 мг N 50 ... упаковка ... 1 ... 20 ... 3 ... 2
- 10 "Р 2.2.2006-05. 2.2. Гигиена труда. Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда"  
(утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 29.07.2005)  
| 12 ... 4-Гидрокси-3-(3-оксо-1-фенилбу-2Н-1-бензопиран-2-онтил), (**варфарин**) ... 81-81-2 ... 0,001 ...  
| а ... 1
- 11 "Клинические рекомендации "Гипертрофическая кардиомиопатия"  
(утв. Минздравом России)  
| Таблица 4/А3. Рекомендуемые режимы антикоагулянтной терапии при ГКМП у беременных с ФП и опасности, связанные с терапией **варфарином**\*\*
- 12 Распоряжение Правительства РФ от 12.10.2019 N 2406-р (ред. от 09.06.2023)  
<Об утверждении перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, а также перечней лекарственных препаратов для медицинского применения и минимального ассортимента лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи>  
| В01АА ... антагонисты витамина К ... **варфарин** ... таблетки
- 13 "Клинические рекомендации "Фибрилляция и трепетание предсердий у взрослых"  
(утв. Минздравом России)  
| А. Кровотечение у пациента, принимающего **варфарин**\*\*
- 14 Распоряжение Правительства РФ от 06.07.2010 N 1141-р (ред. от 01.08.2020)  
<Об утверждении перечня стратегически значимых лекарственных средств>  
| 34. ... **Варфарин**

- 15 "Клинические рекомендации "Трансплантация сердца, наличие трансплантированного сердца, отмирание и отторжение трансплантата сердца"  
(утв. Минздравом России)  
- печеночная недостаточность с уровнем билирубина > 2,5 мг/дл, повышение уровня трансаминаз более, чем в 3 раза, МНО > 1,5 без **варфарина**;
- 16 "Клинические рекомендации "Врожденный клапанный стеноз аорты"  
(утв. Минздравом России)  
- Пациентам с имплантированным в аортальную позицию механическим протезом рекомендуется пожизненный пероральный прием антитромботических средств - антагонистов витамина К (**#варфарин\*\*** в начальной дозе 0,09 мг/кг/сут) с последующей титрацией дозы при постоянном
- 17 "Клинические рекомендации "Врожденная митральная недостаточность (ВМН)"  
(утв. Минздравом России)  
- Рекомендуется пожизненная антикоагулянтная терапия **варфарином\*\*** (АТХ В01АА03) пациентам после протезирования митрального клапана в условиях искусственного кровообращения с имплантацией механического протеза [200 - 213].
- 18 "Клинические рекомендации "Врожденный подклапанный стеноз аорты"  
(утв. Минздравом России)  
- Пациентам с имплантированным в аортальную позицию протезом рекомендуется пожизненный пероральный прием не прямых антикоагулянтов (антагонистов витамина К) (**#варфарин\*\*** в начальной дозе 0,09 мг/кг/сут.) с последующей титрацией дозы при постоянном мониторинге
- 19 "Клинические рекомендации "Единственный желудочек сердца"  
(утв. Минздравом России)  
...мг/кг/сутки при весе более 10 кг, но не более 100 мг/кг/сутки) [20, 31, 36], у взрослых - 50 - 200 мг/сутки или **варфарин\*\*** в возрастной дозировке. тромбопрофилактика **#ацетилсалициловой кислотой\*\*** продолжается, не менее 6 мес или до момента следующего этапа хирургического
- 20 "Клинические рекомендации "Венозные осложнения во время беременности и послеродовом периоде. Акушерская тромбоэмболия"  
(утв. Минздравом России)  
- **Варфарин\*\*** не рекомендован для лечения и профилактики ВТЭО во время беременности <15>, <16> [116 - 119].
- 21 "Клинические рекомендации "Нарушение обмена серосодержащих аминокислот (гомоцистинурия)"  
(утв. Минздравом России)  
В послеродовом периоде может назначаться **варфарин\*\*** (в дозе до достижения полного антикоагулянтного эффекта с целью лечения и профилактики тромбозов) [4, 5, 92]

22 "Методические рекомендации "Стандарт диагностики и лечения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) у военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации. Версия 3 от 08.10.2021"  
(утв. Минобороны России 08.10.2021)

У пациентов, принимающих прямые пероральные антикоагулянты или антагонист витамина К (**варфарин**), для профилактики инсульта при фибрилляции предсердий или предыдущих эпизодах венозных тромбозов, рекомендуется отменить их прием и назначить НМГ.

23 "Клинические рекомендации "Цистит у женщин"  
(утв. Минздравом России)

Вы все же можете попробовать принимать ежедневно клюквенный сок, однако помните, что его нельзя сочетать с **варфарином**, так как это сочетание может привести к кровотечениям.

24 "Клинические рекомендации "Переломы проксимального отдела бедренной кости"  
(утв. Минздравом России)

- Не рекомендуется всем пациентам, которым поставлен диагноз ППОБК, рутинно выполнять коагулограмму (исследование на автоматическом коагулометре), рекомендуется выполнять коагулограмму (ориентировочное исследование системы гемостаза) при наличии клинических

25 "Клинические рекомендации "Инфекционный эндокардит и инфекция внутрисердечных устройств"  
(утв. Минздравом России)

- У пациентов с ИЭ, которые получают **варфарин\*\***, при ишемическом инсульте без кровоизлияния рекомендовано рассмотреть замену антикоагулянтов непрямых (антагонисты витамина К) на гепарин натрия\*\* или НМГ (например, надропарин кальция/эноксапарин натрия\*\*/далтепарин

26 "Клинические рекомендации "Болезнь Паркинсона, вторичный паркинсонизм и другие заболевания, проявляющиеся синдромом паркинсонизма"  
(утв. Минздравом России)

При иной опасности кардиогенной эмболии или неэффективности антиагрегантов, кроме гепарина также возможно назначение антитромботических средств (**варфарин\*\***, дабигатрана этексилат\*\* и др.) [449]. При наличии обширного лейкоареоза и микрогеморрагий на МРТ

27 "Клинические рекомендации "Переломы костей голени"  
(утв. Минздравом России)

За трое суток до отмены прямых антикоагулянтов - **варфарин\*\*** по 1 таблетке один раз в сутки на протяжении всего срока иммобилизации (при ранней разработке - не применяется).

28 "Клинические рекомендации "Серповидно-клеточные нарушения"  
(утв. Минздравом России)

- Детям с СКБ с гиперкоагуляцией рекомендуется проведение антикоагулянтной терапии **варфарином\*\*** [126, 127].

- 29 "Клинические рекомендации "Идиопатический легочный фиброз"  
(утв. Минздравом России)  
| - **Варфарин**\*\* (Код АТХ: B01AA03) не рекомендуется для лечения ИЛФ [2].
- 30 "Клинические рекомендации "Генерализованное тревожное расстройство"  
(утв. Минздравом России)  
| В отличие от большинства антидепрессантов прегабалин\*\* не ингибирует ферменты цитохрома P450, не имеет лекарственных взаимодействий с другими препаратами (напр., **варфарином**) и может применяться у больных ГТР и хроническими соматическими заболеваниями.
- 31 "Клинические рекомендации "Ишемический инсульт и транзиторная ишемическая атака у взрослых"  
(утв. Минздравом России)  
| ...В исследовании ECASS-III исключали пациентов в возрасте старше 80 лет; пациентов, получавших **варфарин**\*\*, независимо от значения международного нормализованного отношения; пациентов, имеющих в анамнезе одновременно сахарный диабет и предыдущий ишемический
- 32 "Клинические рекомендации "Переломы бедренной кости (кроме проксимального отдела бедренной кости)"  
(утв. Минздравом России)  
| Повышенный риск кровотечений по сравнению с **варфарином**\*\* у пациентов  $\geq 75$  лет [27]
- 33 "Клинические рекомендации "Аномальные маточные кровотечения"  
(утв. Минздравом России)  
| - антикоагулянт непрямого действия (**варфарин**) и др.
- 34 "Временные методические рекомендации "Ведение пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения в контексте пандемии COVID-19. Версия 2"  
(утв. Минздравом России 16.04.2020)  
| - При приеме **варфарина** и ингибиторов протеазы показан частый контроль МНО с соответствующей коррекцией дозы **варфарина**, особенно после начала, прекращения или изменения дозы ингибитора(ов) протеазы.
- 35 "Клинические рекомендации "Старческая астения"  
(утв. Минздравом России)  
| Комментарии: Пожилым пациентам с неклапанной ФП и КК  $> 30$  мл/мин предпочтительно назначать апиксабан\*\*, ривароксабан\*\* или дабигатрана этексилат\*\*, нежели **варфарин**\*\* [137]. Апиксабан\*\* и ривароксабан\*\* не рекомендованы при КК  $< 15$  мл/мин, дабигатрана этексилат\*\* -

- 36 "Клинические рекомендации "Легочная гипертензия, в том числе хроническая тромбоэмболическая легочная гипертензия"  
(утв. Минздравом России)  
- Рекомендуется отмена **варфарина\*\*** беременным с ЛАГ, получавших антикоагулянт непрямой (антагонист витамина К) до беременности, из-за эмбрио- и фетотоксических эффектов препарата (сразу после подтверждения состояния беременности) и инициация терапии гепаринами в
- 37 "Клинические рекомендации "Миокардиты"  
(утв. Минздравом России)  
Пациентам с тромбозом глубоких вен голени, развившимся в остром периоде миокардита, рекомендован перевод на терапию **варфарином\*\*** на срок до 3 месяцев, а при повторных венозных тромбозах - осуществлять такую терапию неограниченно долго [180].
- 38 "Клинические рекомендации "Когнитивные расстройства у лиц пожилого и старческого возраста"  
(утв. Минздравом России)  
Кроме того, контроль показателей свертываемости крови может потребоваться у части пациентов с СКР, получающих антикоагулянтную терапию с применением **варфарина\*\*** (контроль МНО).
- 39 "Клинические рекомендации "Хроническая боль у пациентов пожилого и старческого возраста"  
(утв. Минздравом России)  
Показано, что омепразол\*\* и, частично, лансопразол замедляют метаболизм карбамазепина\*\*, циклоспорина\*\*, диазепамы\*\*, дигоксина\*\*, нифедипина\*\*, фенитоина\*\*, теофиллина, **варфарина\*\***, клопидогрела\*\*.
- 40 "Клинические рекомендации "Острый инфаркт миокарда с подъемом сегмента ST электрокардиограммы"  
(утв. Минздравом России)  
Комментарий: данные о сравнительной эффективности прямых пероральных антикоагулянтов и **варфарина\*\*** у пациентов с ИМ ограничены анализом подгрупп в рандомизированных контролируемых исследованиях.
- 41 "Клинические рекомендации "Острый коронарный синдром без подъема сегмента ST электрокардиограммы"  
(утв. Минздравом России)  
...в сутки в составе двойной антитромбоцитарной терапии (в сочетании преимущественно с клопидогрелом\*\*) у пациентов, подвергнутых стентированию КА, безопаснее тройной антитромботической терапии (сочетание **варфарина\*\***, преимущественно клопидогрела\*\* и АСК\*\*).

- 42 ["Клинические рекомендации "Первичные опухоли центральной нервной системы"](#)  
(утв. Минздравом России)
- При постоянном использовании пациентами антикоагулянтов/антиагрегантов (**варфарин\*\***, клопидогрел\*\*, ацетилсалициловая кислота\*\*, фениндион, аценокумарол и т.п.) рекомендовано переводение на низкомолекулярные гепарины (например, под контролем тромбоэластограммы)
- 43 ["Организация проведения профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения. Методические рекомендации"](#)  
(утв. Минздравом России 22.10.2019)
- Важно помнить, что при антикоагулянтная терапия с использованием **варфарина** эффективна только при регулярном лабораторном контроле и поддержании показателя МНО в пределах целевых значений (2,0 - 3,0).
- 44 ["Клинические рекомендации "Болезнь Фабри"](#)  
(утв. Минздравом России)
- Рекомендуется у пациентов с БФ при фибрилляции предсердий проводить антикоагулянтную терапию В01АА03 **Варфарином\*\*** [26 - 29].
- 45 Приказ Минздрава России от 11.09.2023 N 469н  
["Об утверждении перечня лекарственных препаратов в целях обеспечения пациентов, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием"](#)  
(Зарегистрировано в Минюсте России 13.09.2023 N 75200)
9. ... **Варфарин** ... таблетки ... 2,5 мг
- 46 Приказ Минздрава России от 01.02.2023 N 36н  
["Об утверждении перечня лекарственных препаратов и фармакотерапевтических групп лекарственных препаратов, разрешенных к реализации в рамках эксперимента по осуществлению розничной торговли лекарственными препаратами для медицинского применения, отпускаемыми"](#)  
(Зарегистрировано в Минюсте России 21.02.2023 N 72431)
- Варфарин** ... В01АА03 ... антикоагулянтное средство непрямого действия ... таблетки
- 47 Приказ Минздрава России от 04.10.2022 N 646н  
["Об утверждении стандарта медицинской помощи взрослым при ожогах термических и химических, ожогах солнечных, ожогах дыхательных путей \(диагностика и лечение\)"](#)  
(Зарегистрировано в Минюсте России 09.11.2022 N 70871)
- ... **Варфарин** ... 0,0028 ... мг ... 5 ... 35

- 48 Приказ Минздрава России от 29.09.2022 N 639н  
"Об утверждении перечня лекарственных препаратов для медицинского применения в целях обеспечения в амбулаторных условиях лиц, находящихся под диспансерным наблюдением, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым (Зарегистрировано в Минюсте России 27.10.2022 N 70725)  
| 9. ... **Варфарин** ... таблетки ... 2,5 мг
- 49 Приказ Минздрава России от 10.06.2021 N 612н (ред. от 27.05.2022)  
"Об утверждении стандарта медицинской помощи взрослым при остром инфаркте миокарда с подъемом сегмента ST электрокардиограммы (диагностика, лечение и диспансерное наблюдение)"  
(Зарегистрировано в Минюсте России 08.07.2021 N 64164)  
| ... **Варфарин** ... 0,01 ... мг ... 5 ... 1 825
- 50 Приказ Минздрава России от 24.12.2012 N 1554н (ред. от 20.04.2022)  
"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при сердечной недостаточности"  
(Зарегистрировано в Минюсте России 20.03.2013 N 27789)  
| ... **Варфарин** ... мг ... 7,5 ... 105